

688. **Epidendrum Radlkoferianum** Schltr., spec. nov. — Epiphyticum, erectum, 18—25 cm altum; rhizomate verosimiliter abbreviato; caulibus maturis non visis, juvenilibus cylindraceutis, vaginis c. 4 arcte et alte amplectentibus omnino obtectis, apice unifoliatis, 5—10 cm altis, 5—6 mm diametientibus; folio erecto-patente vel suberecto, ligulato, acuto, coriaceo, 6—8 cm longo, 8—10 mm lato; racemo espathato, arcuato, laxe 6—10 floro usque ad 13 cm longo, pedunculo brevi, 2—4 cm longo; bracteis erecto-patentibus, lanceolatis, acutis, ovarii dimidium superantibus, satis magnis; floribus in sectione mediocribus, erecto-patentibus, textum tenuioribus; sepalis patentibus, anguste oblongo-ligulatis, acuminatis, 1,8 cm longis, 3 mm latis, lateralibus obliquis; petalis reflexo-patentibus anguste et oblique linearibus, acuminatis, 5-nerviis, quam sepala fere aequilongis; labelli ungue anguste lineari, columnae marginibus omnino adnato, 7 mm longo, lamina subreniformi-cordata, obscure trilobata, apiculata, antice late triangula, margine dimidio anteriore subcrenulata et leviter undulata, basi breviter cordata, 9 mm longa, medio 1,1 cm lata, basi callis 2 brevibus, lamelliformibus obtusis parallelis ornata, toris 3 approximatis linearibus usque supra medium decurrentibus antepositis; columna gracili, leviter curvata, apice dilatata, clinandrio dorso denticulato, 8 mm longa; ovario graciliter pedicellato, glabro, pedicello incluso 2,3 cm longo. — Panama: Provinz Chiriqui. — Dr. Moritz Wagner, im April 1858.

Leider liegen nur junge blühende Triebe vor. Der ganze Aufbau der Pflanze läßt aber vermuten, daß eine abweichende Art der „*Euepidendra-Racemosa*“ vor uns haben; bemerkenswert ist aber das Vorhandensein eines einblättrigen Stammes. Sollte hier etwa eine *Aulizeum*-Art mit ungeteiltem Labellum vorliegen?