

E. brevicaule Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, breve, floriferum usque ad 5 cm altum; rhizomate brevi; caulis simplicibus erectis, dense, 7—10-foliatis, vaginis foliorum omnino obtectis, usque ad 3 cm longis, c. 5 mm diametro; foliis patentibus, ligulatis, obtusis, carnosis, 1,3—1,7 cm longis, medio fere 3—4 mm latis, vaginis dilatatis, hyalino-marginatis; floribus ad apices caulium geminatis, foliis 2 vaginiformibus basi protectis, erectis, glabris, folia superiora manifeste superantibus, textura tenuibus, haud valde apertis; sepalis ligulatis, acutis, 3-nerviis, c. 2 cm longis, lateralibus obliquis tertia parte inferiore margine anteriore columnae adnatis; petalis sepalis lateralibus similibus sed paululo angustoribus et brevioribus, usque infra medium margine anteriore columnae adnatis; labelli ungue ligulato, marginibus columnae omnino adnato, 1,4 cm longo, lamina reniformi, breviter apiculata, nuda, marginibus medio leviter undulata, 4,5 mm longa, infra medium c. 8 mm lata; columna leviter curvata, satis gracilis, 1,4 cm longa, lobis lateralibus falcato-semioblongis, obtuse apiculatis, clinandrio dorso lacerato-denticulato; ovario subsessili, glabro, c. 7 cm longo.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 18.

Wir haben hier offenbar eine nahe Verwandte des *Epid. (Nanodes) discolor* (Ldl.) Bth. vor uns, aber mit viel größeren Blüten und vollständig nackter Lippe. Auffallend ist bei unserer Art, die hoch hinaufreichende Verwachsung der Petalen und seitlichen Sepalen mit der Säule.

Die Blüten haben eine eigenartige trübe rötlichbräunliche Färbung mit purpurroter Lippe.