

76. **Epidendrum trachythece** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum ramosum, humile; caule valde ramoso tereti, foliato, vaginis arcte amplexantibus dense rugulosis oblecto; foliis ligulatis obtusis, erecto-patentibus glabris, textura crassis, superne lucidis, 1,7—2,2 cm longis, medio fere 3—3,5 mm latis; inflorescentia abbreviata pauciflora, foliis bene brevioribus, basi vaginis 2—3 protecta; floribus in genere inter minores, illis *E. ramosi* Jacq. fere aequimagnis; bracteis parvulis, floribus brevioribus; sepalis ovato-oblongis, acutis, c. 0,3 cm longis, lateralibus paulo obliquis, glabris; petalis oblique lineari-ligulatis obtusis, glabris, sepalis aequilongis, textura paulo tenuioribus; labello subreniformi apiculato, carnosio, ungue lato lineari columnae alte adnato, callo oblongo obtuso, duplici in basi laminae c. 1,5 mm longae c. 2 mm latae; columna brevi apicem versus alato-dilatata, clinandrio truncato, dorso leviter emarginato, antice rotundato; anthera cucullata obtusata, glabra; ovario cylindraceo glabro, c. 0,3 cm longo.

✓Costa-Rica: In den Wäldern von Pablazo, c. 1800 m ü. d. M. — A. Tonduz no. 7941; blühend im April 1883.

Die Pflanze gehört in die nähere Verwandtschaft des *Epidendrum ramosum* Jacq., ist aber durch die kürzeren Brakteen und die sehr kurzen Inflorescenzen zu unterscheiden.