

Physurus Lehmannii Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, c. 20—25 cm alta; rhizomate cauliformi, decumbente, laxe radicante; radicibus flexuosis, villosis; caule tereti, glabro, laxe 5—6-foliato, erecto, c. 5 mm diametro; foliis erecto-patentibus, lamina oblique ovato-lanceolata, acuminata, basi rotundata, 4—4,5 cm longa, infra medium 1,8—2 cm lata, petiolo basi dilatata vaginante, ad 2 cm longo; scapo erecto, stricto, cum racemo 15—17 cm longo, vaginis c. 4 lanceolatis acuminatis, arcte amplectentibus distanter obsesso, basi glabro, apicem versus glanduloso-pilosulo; racemo laxe 10—15-floro, elongato, ad 7 cm longo, erecto; bracteis lanceolatis, acuminatis, inferioribus ovarium superantibus, superioribus sensim brevioribus; floribus subsecundis, illis *P. plantaginei* Ldl. paulo minoribus; sepalis oblongo-ligulatis, obtusis, concavis, extus sparsim glanduloso-pilosulis, 5 mm longis, lateralibus obliquis, basi margine exteriore paululo dilatatis; petalis sepalo intermedio margine interiore agglutinatis anguste oblongo-ligulatis, obtusis, obliquis, quam sepala subaequilongis margine papilloso-ciliolatis; labello circuitu oblongo, margine supra basin eroso-paucidentato, infra apicem paulo angustato, apice utrinque obtuse angulato, breviter apiculato, petalis aequilongo, medio fere 2,5 mm longo, calcare oblongoideo obtuso, decurvo, 2,5 mm longo; columna brevi, rostello bifido erecto inclusa c. 2,5 mm longa; ovario sessili, cylindraceo, c. 6 mm longo.

Costa Rica. — F. C. Lehmann n. 1757 (1882).

Wohl am nächsten mit *P. secundus* Ames verwandt, aber unterschieden durch das am Rande oberhalb der Basis gezähnelte, an der Spitze in zwei vorspringende Winkel verbreiterte Labellum.