

CHONDRORHYNCHA ANDREAE Ortiz, sp. nov.

TIPO: Chocó: Bajo Río Atrato (fide collectoris). Floreció en el cultivo de Senén Rendón, La Delfina (Buenaventura, Valle del Cauca), octubre 28, 1993. *P. Ortiz 1055* (Holotipo. Herbario de la Universidad Javeriana, Bogotá [= UJCOL]).

Species haec distinguitur vaginis et basibus foliorum purpureo maculatis, floribus magnis labello intense rubro-purpureo maculato, callo lato pluridentato, crista centrali parum elevata.

(*) Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

ORQUIDEOLOGIA 19 (2), 1994


13

Plantas epífitas, medianas, con tallos cortos completamente cubiertos por vainas foliares dísticas, imbricadas, cubiertas de puntos moradas. **Hojas** oblongo-elípticas, agudas, de hasta 50 cm de longitud por 6 cm de anchura máxima, en la base y en parte del envés cubiertas de puntos morados. **Inflorescencias** una o más, unifloras, erectas, producidas de la axila de las vainas foliares, con escapos fuertes, de 8-10 cm de longitud, con tres brácteas. **Flores** grandes, vistosas, resupinadas, sépalos y pétalos de color crema, el dorsal y los pétalos con los ápices teñidos de rojo-morado, labelo blanquecino densamente cubierto de puntos de color rojo-morado, la base y el ápice sólidamente de color rojizo con puntos más oscuros. Sépalo dorsal oblongo-elíptico, extendido hacia adelante y con el ápice arqueado hacia atrás, de 3.8 x 0.8 cm; sépalos laterales oblongos, agudos, falcados, extendidos y algo erectos, con los bordes inferiores involutos, de 5 x 0.8 cm. Pétalos oblongo-elípticos, extendidos hacia adelante y con los ápices arqueados hacia atrás, en parte cubriendo el sépalo dorsal, de 3.3 x 1 cm; labelo elíptico, de 5 x 3.8 cm, en los dos tercios basales profundamente cóncavo y con el tercio apical deflexo, con los bordes ondulados, en la lámina con una costilla poco elevada que se extiende desde la base hasta la mitad y un callo pluridentado en la parte central, emarginado en el centro. **Columna** más o menos recta y cilíndrica, de 1.5 cm de longitud, ensanchada en la base formando un pie, con pelos cortos por el lado ventral de la parte basal, y con bordes prominentes, un poco más prominentes abajo del estigma; rostelo tripartito, con el diente central más largo. Polinios 4, frontalmente aplanados, más largo el par frontal, con viscidio escutiforme oblongo.

Las flores tienen un marcado olor a lima.

ETIMOLOGÍA: Tengo el gusto de dedicar esta especie a Andrea Niessen de Uribe, Presidenta de la Sociedad Vallecaucana de Orquideología, quien ha venido cultivando esta y otras orquídeas con éxito.

Esta especie, una de las más grandes y vistosas dentro del género, parece tener alguna afinidad con *Chondrorhyncha maculata* Garay (véase la fotografía en colores publicada en *Orquideología 4: 155. 1969*), pero se diferencia de ella por tener las vainas foliares y la base y parte del envés de las hojas manchados de morado, por las flores mucho mayores, por la disposición de los sépalos y los pétalos, por el color mucho más oscuro y por la forma del callo. El olor a lima de las flores es notable.



CHONDRORHYNCHA ANDRAEAE

Ortiz