

Goodyera R. Br.

Goodyera micrantha Schltr., nov. spec.

Terrestris, erecta, 16—20 cm alta; rhizomate decumbente, cauliformi; radicibus flexuosis, singulis, minute pilosulis; caule tereti, e basi glabrata apicem versus minute glanduloso-puberulo, supra basin c. 4 mm diametro, usque infra medium 4—6-foliato, caeterum vaginis c. 4 acuminatis, appressis laxe obsessis; foliis erecto-patentibus, petiolatis, lamina lanceolata, acuta, basi rotundata, paulo obliqua, 3,2—4,5 cm longa, infra medium 1,4—2,3 cm lata, petiolo sulcato basi dilatata caulem amplectente, 1,5—2 cm longo; racemo erecto, dense 12—18-floro, subsecundo, usque ad 5 cm longo; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovarium paulo excedentibus; floribus in genere inter minimos, ovario excepto glabris; sepalis oblongis, acutis, vix 4 mm longis, uninerviis, lateralibus obliquis; petalis sepalo intermedio aequilongo margine interiore agglutinatis, e basi angusta oblique semirhombeis, uninervis, margine exteriori dimidio superiore leviter undulatis; labello ovali obtusiuscule acuminato, basi concavo, laevi, uninervio, c. 3,75 mm longo, medio 2,5 mm lato; columna recta, semitereti, c. 2 mm alta, rostello alte bifido; ovario sessili fusiformi; minutissime papilloso-glanduloso, c. 5 mm longo.

Costa Rica: Umgebung von San Ramon — G. Acosta, im Jahre 1921.

In der Form der Lippe erinnert die Art an die unten beschriebene *G. Turialbae* Schltr., von der sie aber durch dunkelgrüne, in der Mitte resp. zu beiden Seiten des Mittelnervs mit einer schmalen, weißen Treppelinie geschmückten Blätter, kleinere Blüten, schmälere Petalen und die kürzere Säule mit sehr kurz ausgeschnittenem Rostellum gut unterschieden ist.