

Habenaria platantheroides Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, 24—40 cm alta; caule stricto vel subflexuoso, tereti, glabro, 6—8-foliato, 3—4 mm diametro, basi paucivaginato; foliis erecto-patentibus anguste lanceolatis vel lanceolato-ligulatis, acuminatis, 7—13 cm longis, medio fere 8—15 mm latis; racemo erecto, subdense 10-multifloro, usque ad 8 cm longo; bracteis lanceolatis, acuminatis, inferioribus flores superantibus, superioribus sensim brevioribus; floribus in genere mediocribus, illis *H. strictae* A. Rich. et Gal. similibus; sepalis oblongo-ellipticis, apiculatis, margine et nervis incrassatis extus papillosis, 6 mm longis, intermedio concavo, lateralibus obliquis; petalis oblique ligulatis, obtusis, basin versus margine anteriore paululo dilatatis, quam sepala subaequilongis; labello carnosulo lineari-ligulato obtuso, basi rotundato, 6 mm longo, calcaré pendulo, gracili, levitèr curvato, subfiliformi, obtusiusculo, glabro, 1 cm longo; anthera humili obtusa, canalibus adscendentibus, brevibus; processibus stigmatiferis porrectis, oblongis, obtusis, superne applanatis, canales antherae paululo superantibus; ovario acute 6-costato, praesertim apicem versus, costis minute papillosis, cum pedicello glabro subclavato-fusiformi, c. 1,3 cm longo.

Costa Rica: La Palma. — C. Wercklé 1913.

Allein Anschein nach steht diese Spezies der *H. stricta* A. Rich. et Gal., einer nur aus der Abbildung bekannten Art am nächsten. Sie ist zu unterscheiden durch die am Rande und auf den verdickten Nerven außen fein papillösen Sepalen, das stumpfe Labelum und das scharf sechskielige oder sechsflügelige Ovarium. Im Habitus erinnert die Art stark an gewisse *Platanthera*-Arten.