

**Habenaria verecunda** Schltr., nov. spec.

Herba vix ultra spithamaea, gracilis, 15—20 cm alta; tuberibus oblongoideis, parvulis; caule erecto, leviter flexuoso, tereti, glabro, laxe 3-foliato, pro genere rigidiusculo, supra basin c. 2 mm diametro; foliis erecto-patentibus, anguste ligulatis, acutis vel valde acutis, inferiore 7 cm longo, medio c. 6 mm lato, superioribus brevioribus; racemo laxe 6-floro, 7—8 cm longo, erecto; bracteis suberectis, lanceolatis, valde acuminatis, inferioribus flores subaequantibus, superioribus ovarium subaequantibus; floribus in genere inter minores, glabris; suberectis; sepalo intermedio erecto, elliptico, obtusiusculo, concavo, 3-nervio, 3 mm longo, lateralibus patenti-deflexis, oblique oblongo-ovatis, valde acuminatis, intermedio sublongioribus; petalis erectis, bipartitis; partitione posteriore oblique lineari-ligulata, obtusiuscula, anteriore subduplo brevior, subulata; labello 3-partito, partitione intermedia porrecto-decurva lineari, obtusa, vix 3 mm longa, lateralibus subtriplo brevioribus, leviter divergentibus, subulatis, acutis, calcare dependente, cylindraceo, apice vix incurvulo subacuto, c. 3 mm longo, i. e. sepalis fere aequilongo; anthera suberecta, perbrevis, obtuse apiculata, canalibus brevibus adscendentibus; processibus stigmatiferis, crassiusculis, quam canales sublongioribus; ovario sessili, cylindraceo, torto, glabro, 8—9 mm longo.

Costa Rica: Ohne nähere Standortsangabe — C. Wercklé no. 144.

Unter den zentralamerikanischen kenne ich keine Art, welche der vorliegenden näher steht. Ich glaube, daß ihre Verwandten mehr in den Steppen Südamerikas zu suchen sind. Im Habitus erinnert die Pflanze z. B. an *H. cultellifolia* Rodr. aus Brasilien, ist aber niedriger und hat einen viel kürzeren Sporn.