

PLEUROTHALLIS ? VALENZUELANA. *Nob.*

P. ebulbis, acaulis; foliis distichis approximatis, ensiformibus, gladiatis, lanceolatis, acutis, basi imbricato-vaginantibus, crassis, glaucescentibus, 6-9 uncias longis, 4-6 lineas latis; pedunculis brevibus 1-floris, axillaribus, rigidis, bracteis pluribus lanceolatis acutis, tenuimembranaceis obtectis; flore breviter pedicellato, apice pedunculi articulato, deciduo, amplitudine medio (colore luteo?) sepalo superiore ovali-lanceolato acuto, convexo, inferioribus basi productis, lanceolatis acutis, paulo longioribus; internis (petalis) anguste lanceolatis acutis, tenuioribus et paulo brevioribus; labello basi productæ gynostemii articulato, erecto, trilobo, angusto; lobis lateralibus longis obtusis parum productis, intermedio crasso linguæformi acuto.

Crescit parasitica in cortice arborum, in sylvis partis occidentalis insulæ Cubæ. (*Vuelta de abajo*), J. M. Valenzuela.

Observaciones. Por su porte, la forma y la disposicion de sus hojas, recuerda esta especie á muchas del género OBERONIA. En el corto número de flores que examinamos, habian ya caido las anteras y el polen, y por esto colocamos con duda esta planta en el género PLEUROTHALLIS. Es probable que cuando sean conocidos su antera y polen, nuestra planta constituya un género nuevo distinto de los PLEUROTHALLIS, por su porte, las hojas dísticas y los pedúnculos axilares.