

***Kefersteinia ricii*** VÁSQUEZ & DODSON, sp. nov. (Fig. 3).

*Ab congeneribus labello rhombeo basi cuneata in medio abrupte recurvato, margine eroso, callo bipartito lamella duabus alba, primo erecta, postea revoluta formato, columna alata, in medio tumida et carina brevi infra stigma differt.*

Planta epífita, cespitosa, sin pseudobulbos. Rizomas cortos. Hojas 3-5, oblanceoladas, carinadas, articuladas, conduplicadas hacia la base, las basales parcialmente cubiertas por vainas; láminas oblongo-lanceoladas, 10-18 cm de largo, 0.5-1 cm de ancho. Inflorescencia basal, uniflora; pedúnculo curvado, 7-8 cm de largo; brácteas 3, cortamente infundibuliformes, 5-6 mm de largo. Ovario y pedicelo 12-14 mm de largo, el ovario surcado. Flores solitarias; sépalos y pétalos oblongo lanceolados, atenuados y parcialmente conduplicados hacia el ápice, blancos con tinte verdoso; sépalo dorsal 16 x 4 mm; sépalos laterales ligeramente falcados, moteados de violeta oscuro en la base, 16 x 5 mm; pétalos 15 x 4 mm; labelo romboide, 17 x 11 mm, blanco con rayas y manchas violeta oscuras, ligeramente pubérulo delante del callo, unido a la columna por una lamela corta, la base cuneada y bruscamente curvada por el medio, el ápice apiculado, el margen roído; disco blanquecino con tinte violeta, formado por dos lamelas carnosas, erectas con el ápice bifurcado y revoluto; columna blanca con manchas violetas en la superficie abaxiales, 10 mm de largo, ensanchada y subalada; quilla corta debajo el estigma; antera blanca, 3 mm de largo; polinios 4, en 2 pares desiguales.

NUEVAS ORQUIDEAS DE BOLIVIA




Fig. 3. *Kefersteinia ricii* VÁSQUEZ & DODSON

Dibujo: Roberto Vásquez

1  
VASQUEZ & DODSON

TIPO: BOLIVIA: SANTA CRUZ: Provincia Caballero: El Tunal, al NE de Comarapa, epífita en bosque de galería montano húmedo, coleccionado y cultivado por el señor Darwin Ric s.n., floreció en cultivo el 24 de Oct. de 1990, *R. Vásquez 1261* (Holotipo: LPB; isotipo: Herb. Vasquezianum).

ETIMOLOGIA: Dedicamos esta especie en honor a su descubridor, el señor Darwin Ric.

DISTRIBUCION: Endémica de Bolivia. Conocida exclusivamente de las quebradas montañosas al NE de Comarapa, Prov. Caballero, Dept. de Santa Cruz.

ECOLOGIA: Epífita en los últimos bosques húmedos de montaña antes de la transición a bosque seco andino. Crece juntamente con *Epidendrum quinquepartitum*, *Trichopilia fragans* y *Maxillaria rufescens*.

OTROS ESPECIMENES: De la misma localidad, 24 Jul. 1995, *R. Vásquez & D. Ric 2545* (Herb. Vasquezianum).

Esta nueva especie de *Kefersteinia* se distingue por el labelo romboide, la parte basal cuneada y la parte media brúscamente recurvada, por el margen roído y por el callo formado por dos lamelas blancas, al principio erectas luego bifurcadas y revolutas; además, la columna se ensanchada en la parte media y muestra una carina corta debajo del estigma.