

LACÆNA BICOLOR VAR. **GLABRATA.**

LACÈNE BICOLORE', var. *glabre.*

ÉTYM. L'auteur du genre (*l. i. c.*) a donné à celui-ci le nom de *Lacæna*, épithète qu'avait appliquée Virgile (1), par rapport au lieu de sa naissance, à la fameuse Hélène (Λάκαινα, la lacédémonienne). Il ajoute par *erreur* qu'on peut aussi en dériver l'étymologie de *λακίς* (déchirure) par allusion aux divisions du labelle, oubliant tout d'abord que le génitif de ce mot est *λακίδος*; ce qui la rend *impossible*.

Orchidaceæ § Vandææ §§ Maxillarææ.

CHARACT. GENER. *Perianthium* carnosum patens, *sepalis* subæqualibus basi subconnatis; *petalis* conformibus minoribus. *Labellum* cum gynostemate et in medio articulum, *hypochilio* unguiculato cuneato bilobo apice pulvinate, *epichilio* integro. *Gynostema* erectum semiterces. *Pollinia* 2 postice fissa, *caudicula* setacea, *glandula* minuta.

LINDLEY, Bot. Reg. Misc. 101. p. 68. 1843 et ibid. t. 50. 1844.

Herbæ *guatimalenses* et *mexicanæ* *pseudobulbosæ saxicolæ*, et *super truncos arborum* verosimiliter etiam *vigentes*, *scapo radicali pendulo multifloro*... Nos. *ex docum. incompl.*

CHARACT. SPECIF. Pseudob. ovato-subtetragonis alte sulcatis (9-10) exarticulatis, foliis (3) elliptico-lanceolatis subcoriaceis extus tri-costatis, intervallis subplicato-venosis apice vix acuminatis; pedicellis sat brevibus, bracteis median.

longit. eorum æquantibus oblongo-acuminatis cito brunneo-siccantibus gibbulum terminantibus; floribus carnosulis: segm. ext. inæqualibus, 2 posticis lanceolatis apice acutis subplicatis concavis basi oblique-rotundatis, supero (3^o) brevior ovato plicatim apiculato concavo-fornicato; 2 later. tribus aliis brevioribus ovatis acutatim retusis incurvis oblique insertis; labello omnibus minore 3-lobato: lobis later. rotundatis erectis (sec. axim!), callo mediano gibboso antice fisso villosa (*hypochilio*), terminali unguiculato (*metachilio*) curvato puberulo, limbo (*epichilio*) subquadrato-rotundato margine undulato apice subacuto recurvo subemarginato crasso convexo extus intus margineque nudato; gynostemate spathulato dorso convexo ventre subconcavo nudo....

Lacæna bicolor LINDL. 1^o cit. — var. *glabrata* Nos. V. ci-dessus, Misc. p. 56 et sub præc. tab.

M. Lindley rapporte (1^o c^o) que l'espèce, qui lui a servi de type pour établir le genre, a été découverte par M. Hartweg, dans les montagnes de Salama, province de la Vera-Paz, et près du village de Semil et de Quetzaltenango, au Guatemala, où elle croît sur les rochers, à une élévation de 7000 pieds, au dessus de la mer. La plante, dont nous nous occupons ici, vient, nous l'avons dit (*l. c.*), du Mexique, d'où elle a été envoyée directe-

(1) Non tibi Tyndaridis factes invisæ Lacænae. VIRG. *Æneid.*

ment, par MM. Toncl, à l'établissement Verschaffelt, en compagnie d'une foule d'autres belles Orchidées, parmi lesquelles quelques intéressantes nouveautés, que nous avons déjà mentionnées ou que nous mentionnerons prochainement. Là, elle occupe vraisemblablement la même station, et probablement aussi, mais plus rarement peut-être, le tronc des arbres, à l'instar de ses alliées, les *Peristeria*, les *Acineta*, les *Catasetum*, les *Mormodes*, etc.

Ainsi que nous l'avons fait observer, les différences qu'elle nous a offertes, en la comparant au type, ne nous ont pas paru suffisantes pour l'en regarder comme distincte, à en juger du moins par la figure qu'en a donnée M. Lindley et les quelques mots qu'il en a dits : car selon sa regrettable coutume il en a omis la description. Le genre contient en ce moment deux espèces, dont la seconde a été décrite par M. Reichenbach, fils (Bonpl. avril 1854), sous le nom de *L. spectabilis* : laquelle, découverte par M. Warszewicz, nous est absolument inconnue, mais doit être plus belle encore que sa congénère, si nous devons nous en rapporter à l'épithète que lui applique (avec raison nous n'en doutons pas !) le savant Orchidologue allemand.

L'individu en question, par le nombre de ses fleurs, le coloris plus décidé d'icelles, l'emporte en beauté sur le type. Ainsi, M. Lindley attribue 9 ou 10 fleurs à celui qu'il a observé : fleurs d'un *jaune verdâtre sombre* (*dull greenish yellow*); le nôtre en portait 18, toutes d'un blanc de crème, avec une simple macule d'un riche violet, et entièrement *glabres*, sauf la villosité du cal qui distingue l'hypochilie du labelle.

La *Lacæna bicolor glabrata* est une belle et bonne plante, encore fort rare (le type a disparu des collections anglaises), et qui mérite, sous tous les rapports, l'attention des amateurs judicieux de ces sortes de plantes, dont la collection est devenue aujourd'hui indispensable pour tout homme de goût.

Cn. L.

CULTURE.

(S. Cn.)

On la cultivera absolument à la manière des *Stanhopea*, en corbeilles ou en vases de terre suspendus, les uns et les autres *ouvragés* de manière que les scapes puissent sortir aisément par les trous ou les mailles, et pendre à leur manière accoutumée. On peut aussi les fixer sur des branches d'arbres, encore revêtues de leur écorce. On seringera fréquemment pendant sa période active; mais on la laissera à peu près sèche pendant son repos. A cette dernière époque, il conviendra de la garder en serre tempérée, pour en faire aoûtter les pseudobulbes jusqu'au renouvellement de la végétation.

A. V.