

39. **Oncidium tricuspidatum**: aff. Oncidio carinato Knw. Weste.
labello ante basin ascendentem deflexo cuneato dilatato bilobo, callo in basi rotundo
tumore anteposito bilobo, columnae brachiis falcatis, rostello ornithorrhyncho bifido
subaequalibus.

Pseudobulbus ligulatus monophyllus pollicaris. Folium cuneato oblongum
acutum, valde coriaceum, siccum multistriatum ac favulosum, duos usque quinque
pollices longum, plus unum latum. Folium stipans, inferius, vulgo melius evolutum.
Vaginae stipantes pedunculi scariosae acuminatae, punctis atratis creberrimis.
Pedunculus validus usque bipedalis, robustus, vaginis distantibus acutis, sursum
paniculatus. Rami plures crassi, longiores, breviores. Bracteae triangulae carinatae
ovariis pedicellatis bene breviores seu subbreviores. Sepala ligulata acuta; lateralia
supra nervum medium carinata. Tepala breviora obtusiora. Labellum basi arrectum,
statim deflexum, subflabellato bifidum laciniis anticis obtusangulis, callo semiro-
tundo in basi, callo simili bilobo anteposito. Columnae breviusculae tabula nulla,
falces duae apicem versus rostellum ornithorrhynchum bifidum incurrentes. Sub
fovea basin usque columnae carina mediana excurrit.

„Hölle braungelb, Lippe gelb. Alles mit röthlichen Punkten.“

Cartago in Costa Rica. 30. 3. 1857.