

L. chiriquensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, c. 4 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radieibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis gracillimus, unifoliatis,

F. Fedde. *Repertorium specierum novarum*. Beiheft XVII.

vaginis c. 3—4 ostio paulo ampliato, lanceolato acuminato et costis paulo muriculatis omnino obtectis, usque ad 2,5 cm longis, vix 0,5 mm diametro; folio erecto, elliptico-lanceolato, sub lente apice tridentato, basi sensim angustato, cuneato, usque ad 2 cm longo, medio fere usque ad 6 mm lato; inflorescentiis vulgo singulis, sensim evolutis, folii dimidium vix aequantibus, pedunculo ad 5 mm longo; racemo ipso paucifloro; bracteis parvulis deltoideis, glabris, pedicello ovarii paulo brevieribus; floribus in genere inter minores, diaphanis, tenuissimis, glabris, explanatis ab apice sepali intermedii usque ad apices sepalorum lateralium c. 4 mm longis; sepalis oblongis, acutiusculis 3-nerviis, c. 2 mm longis, lateralibus obliquis, usque ad medium fere connatis; petalis minutis, transverse ovalibus, obliquis, uninerviis, quam sepala multoties minoribus; labello sepalis fere duplo breviore ex ungue linearis columnae adnato in laminam circuitu quadratam basi obtuse sagittatam, apice profundius bifidam juxta medium latere utrinque longitudinaliter carinatam dilatato; columna arcuata labello aequilonga; ovario cum pedicello aequilongo c. 2 mm longo.

Panama: Chiriquí, c. 5000 Fuß ü. M. in feuchten Schluchten — no. 254.

Eine der kleinsten zentralamerikanischen Arten der Gattung. Sie ist kenntlich durch die kurze Form der Petalen und das Labellum.

Die durchscheinenden, weißen Blüten sind in der Mitte rot.