

267. **Lepanthes guatemalensis** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, gracilis, 3—7 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulis gracilis, vaginis 2—4 arctissime amplectentibus, paucinervatis, nervis et margine apice minute ciliatis omnino obtectis, 1—2 cm longis; folio erecto, obovato, obtuso, minute exciso cum apiculo dorsali, marginato, basi breviter petiolato, lamina 0,8—1,2 cm lata, supra medium 0,4—0,7 cm lata, petiolo 2,5—4,5 mm longo; racemo gracillime pedunculato, laxe paucifloro, folium plus duplo superante, pedunculo filiformi, glabro, rachi usque ad 1,5 cm longa, flexuosa; bracteis apiculatis, dorso sparsim muri culatis, pedicello duplo fere brevioribus; floribus erectis, inversis, glabris; sepalo intermedio latius ovato, acuminato, 7,5 mm longo, lateralibus oblique ovato-lanceolatis, acuminatis, intermedio aequilongis, usque infra medium connatis; petalis transverse bilobatis; lobis oblique linearibus, obtusis, subaequilongis, angulum rectum formantibus, c. 4 mm latis; labello concavo columnam amplectente, basi breviter sagittato, lobis lateralibus, porrectis, oblique ligulatis, obtusis, longitudine dimidium labelli aequantibus, lobo medio obsoleto, labello toto c. 1,75 mm longo, basi 1 mm lato; columna gracili, c. 1,25 mm longa; ovario cum pedicello c. 2,5 mm longo, glabro.

✓Guatemala: Epiphytisch im Hochwalde bei Coban, c. 1550 m ü. d. M. — H. v. Türkheim no. II, 2387, blühend im Juni 1908.

Eine der Arten, bei welchen die lockere Infloreszenz das Blatt bedeutend überragt und daher unter den zentralamerikanischen Arten neben *L. Türkheimii* Schltr. und *L. horrida* Rchb. f. zu verweisen. Die Blüten sind goldgelb.