

Lepanthes inornata Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, usque ad 16 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, vaginis usque ad 9 donatis, costis et apice dilatata lanceolata paulo simpliata muriculato-ciliolatis, vix 1 mm diametiente; folio erecto, elliptico, obtuse acuminato, basi subpetiolato-angustato, usque ad 5 cm longo, infra medium ad 2 cm lato, coriaceo, glabro; inflorescentiis 1—3-nis folium vix aequantibus, pedunculo paucivaginulato, usque ad 2 cm longo, racemo ipso disticho, erecto, quam folia brevioribus; bracteis lanceolatis, muriculatis, ovario pedicellato fere duplo brevioribus; floribus in genere inter mediocres, fide collectoris flavidis, glabris; sepalis ovatis, acuminatis, 3-nerviis, lateralibus obliquis, in flore bene evoluto vix 2 mm excedentibus, glabris, usque supra medium connatis; petalis transversim bifidis, partitione superiore falcato-lanceolata, obtusiuscula, partitione inferiore oblique oblonga, obtusa, paulo longiore; labello bipartito, subsessili, basi alte cordato, partitionibus oblique oblongis, obtusis, carinatis, quam columna paulo brevioribus; columna pro genere crassiuscula, brevi, e basi angustiore apicem versus paulo dilatata, glabra, c. 0,75 mm longa; ovario pedicellato glabro, pedicello 3 mm longo incluso c. 3,5 mm longo.

Costa Rica: Lisière d'un bois, Alto de la Calera de San Mateo alt. 850 m — A. M. Brenes no. 216, XII. 1921. Fleurs jaunes.

Die Art erinnert in mancher Hinsicht und vor allem in der Tracht an *L. erinacea* Rehb. f., hat aber breitere Blätter und andere Blütenteile. Besonders charakteristisch ist die verhältnismäßig kurze Säule. Außerdem stehen die Blütenstiele mehr ab.