



*L. ADUNCANTA*



*L. AGGERIS*




*L. ARBUSCULA*



*L. CINCINNATA*



*L. TSUBOTAE*  
Cultivo: Shigenobu Tsubota



*L. FONNEGRAE*



*L. BIGLOMERIS*



*L. EQUICALCEOLATA*



*L. JARDINENSIS*




*L. FURCATA*

Cultivo: Colomborquideas  
Fotografías:  
Rodrigo Escobar R.

**LEPANTHES JARDINENSIS** Luer & Escobar, sp. nov.


*Planta mediocris vel grandis caespitosa, inflorescentia racemosa laxa disticha fractiflexa folio ovato acuminato duplolongiore, sepalis dorsali ovato acuminato, sepalis lateralibus in synsepalum acuminatum bifidum connatis, petalis transverse bilobis, lobis minute pubescentibus triangularibus obtusis, labelli laminis ovoideis pubescentibus, appendice apice glandulifera.*

Planta grande, epífita, cespitosa; raíces delgadas. Ramicaules erectos, robustos, 7-20 cm de largo, abrazados por 8-14 vainas leparitiformes con cilios microscópicos. Hoja erecta, coriácea, ovada, aguda, acuminada, 7-9.5 cm de largo incluido el peciolo de 3-5 mm de largo, la lámina 2.2-2.7 cm de ancho, cuneada en la base al nivel del peciolo. Inflorescencia racemosa de muchas flores sucesivas en 3-10 racimos laxos, flexuosos, dísticos, hasta de 15 cm de largo incluido el pedúnculo de 3-4 cm de largo; brácteas florales oblicuas, 2 mm de largo; pedicelos 1.5 mm de largo; ovario 1.5-2 mm de largo, las carinas subverrugosas; sépalos de color amarillo oscuro, matizado de marrón-anaranjado, carinados, con pubescencia microscópica, el sépalo dorsal ovado, agudo, acuminado, 6 mm de largo y 3.5 mm de ancho, trinervado, connado con los laterales en 1 mm, los sépalos laterales connados para formar una lámina ovada, bifida, con los ápices acuminados, 6 mm de largo y 4.25 mm de ancho, cuadrinervada; pétalos de color morado oscuro, con pubescencia diminuta, transversalmente bilobulados, 1 mm de largo y 2.66 mm de ancho, los lóbulos subtriangulares, obtusos, el inferior algo



**LEPANTHES JARDINENSIS**

Luer & Escobar.



**LEPANTHES TSUBOTAE**

Luer & Escobar.

más pequeño; labelo morado oscuro, bilaminado, las láminas con pubescencia diminuta, ovoides con extremos redondeados, 1.8 mm de largo, las conectivas cuneadas, el cuerpo ancho, connado con la base de la columna, el seno ancho, el apéndice ovoide con una minúscula glándula esteliforme en la punta; columna 2 mm de largo, la antera apical, el estigma ventral.

**ETIMOLOGIA:** Lleva el nombre del municipio de Jardín en la Cordillera Central de Colombia, lugar de procedencia de la especie.

**TIPO:** Colombia: Depto. de Antioquia: Municipio de Jardín, Alto de Ventanas, en altura de 2800 m, mayo 26 de 1983, R. Escobar, J. Posada, L. de Posada et al. 2696 (Holotipo: JAUM; Isotipo: MO, SEL), C. Luer ilustr. 9115.

Al parecer, esta especie de planta grande es endémica en un bosque residual de la Cordillera Central de Colombia. Se producen unos racimos flexuosos de flores sucesivas de color amarillo oscuro, con los pétalos y el labelo un morado oscuro. Con frecuencia se encuentran dos o tres flores abiertas a la vez. Los sépalos son acuminados y exhiben una pubescencia diminuta; los pétalos son pequeños, pubescentes y transversalmente oblongos. El labelo también presenta pubescencia en sus láminas. El apéndice diminuto lleva en la punta una glándula minúscula esteliforme.