

Lepanthes pantomima Luer & Dressler, sp. nov.

Species haec *L. calodictyon* Hook., affinis, sed foliis cordatis integris nonreticulatis, petalis nonciliatis, labello cordato lobis basilibus columnam amplexantibus differt.

Planta pequeña a media en tamaño, epífita, cespitosa; raíces delgadas. "Ramicaules" muy delgados, suberectos, de 2 a 5 cms. de largo cubiertos por 6 a 7 vainas lepidiformes, apretadas, microscópicamente rugosas, ciliadas. Hojas desplegadas, péndulas, coriáceas,



Fotografía: Kerry Dressler

Lepanthes pantomima

ovadas de color verde satinado, cubiertas de púrpura a lo largo de los bordes y por debajo, ovadas, subagudas a obtusas, enteras, de 21 a 28 mm de largo y 17 a 23 mm de ancho, la base acorazonada, subsésil. La inflorescencia un racimo apiñado que florece sucesivamente y hasta de 6 mm de largo, nacido en la parte alta de la hoja en un pedúnculo filiforme de 5 a 7 mm de largo; brácteas florales muriculadas de 1 a 1.5 mm de largo; pedicelos de 1.5 mm de largo; ovario de 2 mm de largo; sépalos verdes translúcidos, lisos, reflejos, el sépalo dorsal obovado de 4.5 mm de largo y 3.75 mm de ancho, el ápice obtusamente acuminado, la base libre, los sépalos laterales semejantes, de 4.25 mm de largo por 3 mm de ancho, connados en 0.5 mm; pétalos naranja-café claro, lisos (microscópicamente celu-




Ilustración: Carlyle A. Luer

Lepanthes pantomima

lar-pubescentes), la hoja oblonga, de 3.5 mm de largo y 2.5 mm de ancho, el vértice disparejamente bilobado a lo ancho, el lóbulo inferior más largo, la base con apéndice filiforme de 3 mm de largo, el superior erecto, el inferior descendente; labelo púrpura oscuro, liso (microscópicamente celular-pubescente), acorazonado de 2.75 mm de largo por 2.5 mm de ancho, el ápice ampliamente bilobado, los lóbulos basales estrechamente obtusos, abrazando la columna, la base connata a la columna por encima de la base; columna delgada de 2 mm de largo, la antera dorsal y el estigma subapicales.

ETIMOLOGIA: Del Latín *pantomima*, "una actriz mímica", en alusión a la apariencia caprichosa de la flor.

TIPO: PANAMA: PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO: epífita en bosque húmedo entre Fortuna y Chiriquí Grande, alt. 350 m. 17 de febrero de 1985, C. Luer, J. Luer, R. L. Dressler y K. Dressler 10614 (Holotipo: MO).

Aunque le falta el reticulado y las hojas de bordes rizados de *L. calodictyon*, Suramericano, esta especie espectacular es notable por las hojas acorazonadas de color verde satinado. Las flores son muy similares a las del *L. calodictyon*, difiriendo principalmente en los pétalos lisos y en los lóbulos basales del labio que abrazan la columna. Es aún más íntimamente emparentado con el *L. arachnion* del cual *L. pantomima* puede distinguirse por las hojas acorazonadas, flores más grandes con pétalos lisos y labio y lóbulos basales del labio redondeados. (Fotografía de Kerry Dressler).