

**Lepanthes ramonensis** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, usque ad 14 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus simplicibus, vaginis pluribus (c. 10), ostio ampliato lanceolato acuminato et costis perdense et breviter muriculatis, omnino obtectis, usque ad 9 cm longis, vix 1,5 mm diametentibus; folio ovali, obtuse acuminato, apice ipso sub lente 3-dentato, coriaceo, glabro, usque ad 5,5 cm longo, ad 3 cm lato; inflorescentiis quam folia bene brevioribus, distichis, pedunculo paucivaginulato, racemo ipso dense multifloro, usque ad 1,5 cm longo; bracteis lanceolatis, muriculatis, pedicello ovarii brevioribus; floribus in genere inter minores, fide collectoris flavidis, petalis exceptis glabris, ab apice sepali intermedii usque ad apices sepalorum lateralium 6 mm longo; sepalis ovato-lanceolatis, acuminatis, 3-nerviis, lateralibus obliquis, usque ad medium fere connatis; petalis transversis, bifidis, margine minute glanduloso-ciliolatis, quam sepala plus duplo minoribus, partitione superiore triangulo-lanceolata, acuta, inferiore subduplo longiore oblique oblonga, obtusa; labello quam petala bene brevior, basi peralte cordato, bifido, segmentis oblique lanceolatis, acutis vel acuminatis, carinatis, glabris, quam columna conspicue brevioribus; columna gracili, glabra, vix 3 mm longa; ovario pedicellato, glabro, c. 2,5 cm longo.

Costa Rica: Lisière d'un bois à San Rafael de San Ramon, alt. 1200 m — A. M. Brenes no. 207, XI. 1921. Fleurs jaunes.

Im Habitus erinnert die Art an *L. Brenesii* Schltr., von der sie aber durch die bewimperten, oben zugespitzten Petalen und die viel schlankere Säule leicht zu unterscheiden ist. Die Scheiden der Stämme sind bei allen Arten dieser Verwandtschaft schwarz oder dunkelbraun.