

387. **Oncidium salvadorens** Schltr. nov. spec.

Epiphyticum, peraltum; rhizomate valde abbreviato; pseudobulbis more sectionis valde reductis, unifoliatis; folio oblongo, subacuto, carnosio, c. 30 cm longo, medio c. 10 cm lato; panícula pluriramosa, laxe multiflora pedunculo incluso c. 150 cm longa, arcuata, ramis ramulisque erecto-patentibus; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus in sectione inter minores, erecto-patentibus, glabris; sepalis latius ellipticis, obtusis, distincte unguiculatis, margine leviter undulatis, c. 1,2 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique latie elliptico-spathulatis, obtusis, margine bene undulatis, sepalis subaequilongis; labello e basi obcuneata utrinque supra basin plicata supra medium in isthmum brevem constricto, antice in lobum obreniformem margine undulatum dilatato, 1 cm longo, basi 8 mm lato, lobo apicali 6 mm lato, callis 5 aggregatis actyliformibus in basi ornato; columna brevi, carnosa, alis semiquadratis; ovario pedicellato glabro, c. 2 cm longo.

San Salvador: In Wäldern bei Izalco. — H. Pittier, no. 5753, blühend im Februar 1907.

Ich möchte die Art auf Grund ihres Habitus zur Sektion *Sarcoptera* verweisen, obgleich das Labellum für die *Basilata* sprechen würde. Die Blütenfärbung ist nicht angegeben; scheint aber rötlich gewesen zu sein.