

*Lycaste consobrina*: perigonii phyllo supremo oblongo cuneato acuto, phyllis lateralibus externis subaequalibus, latioribus, basi inferiori obtusangulis, lateralibus internis oblongis, basi cuneatis, medio dilatatis, acutis, quam phylla externa medio latioribus, glabris, labello basi naviculari excavato, elongato, phyllis externis subaequilongo, medio trilobo, lobis lateralibus ligulatis obtusis angustis, erectis, abbreviatis, callo magno supino laminaeformi acie libera antrorsa obtusato inter utrumque basesque loborum transgrediente, lobo medio producto oblongo crispulo, apice vix emarginato; gynostemio elongato, gracili, antice papillis filiformibus puberulo, labio stigmatis inferiori parvulo, lunato.

Nächst *Lycaste cochleata* Lindl., allein durch Gestalt der Lippe (kurzer Seitenlappen und langer Mittellappen) sehr gut unterschieden, auch durch kahle seitliche innere Hüllblätter. — *Lycaste aromatica* hat einen am Grunde keilförmigen, kurzen Mittellappen der Lippe, die Unterlippe der Narbe ist zweizählig, die Platte auf der Lippe ist an den Seitenrändern frei. Blüten kleiner. — *Lycaste crinita* Lindl. hat längere Seitenlappen der Lippe, dieselbe und seitliche innere Hüllblätter behaart; die Lippenplatte klein, Farbe der *Lycaste aromatica* Lindl. —