

## RHYNCHADENIA. Nob.

Sepala externa libera, subapproximata, æqualia, supremo concavo, omnia apice apiculata; interna (petala) subsimilia, paulo angustiora, æquilonga; labellum basi cum gynostemio continuum nec articulatum, parallelum, semicanaliculatum, sensim ampliatum, apice truncatum, hinc et illinc obtusum, ligulatum, ligula abrupta linearis acuta, trinervia revoluta. Gynostemium elongatum, arcuatum, margine apiceque alatum; ala terminali ampla, inæqualiter dissecto-denticulata; rostellum elongatum angustum, glandula oblonga elliptica terminatum; pollinia 2 integra in caudicula tenui-membranacea, postice lata, sensim attenuata et longe angustato-lineari insidentia; glandula terminali.





Herbæ epiphytæ; pseudobulbi parvuli ovoideo-oblongi longe attenuati, apice monophylli; scapus radicalis 1-3-florus.

## RHYNCHADENIA CUBENSIS. (Tab. 85.)

Foliis elliptico-lanceolatis acutis submembranaceis, basi articulatis; scapo radicali, foliis breviori, 1-3-floro, simplici aut bifido; floribus parvulis pallide purpureis.

Crescit in sylvis insulæ Cubæ.

*Observaciones.* El género que denominamos RHYNCHADENIA, ocupa un lugar medio entre los géneros ORNITHIDIUM y ORNITHORYNCUS. Difiere del primero por su gynostema cóncavo en el vértice y cuyos bordes están dislacerados, por su largo rostellum, por sus dos masas polinicas sentadas sobre una caudicula muy larga, adelgazada en punta y recubriendo el rostellum, terminada por una glandulita peltada. Difiere del segundo, por su gynostema alargado, sus dos masas polinicas solamente y no cuatro, dispuestas en cruz, y sobre todo por su porte.



*Rohynchadenia Cubensis.* A.R.