

Notylia ramonensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, pusilla, 5—7 cm alta; rhizomate subnullo; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; foliis in quoque surculo 4—6, erecto-patentibus, equitantibus, ligulato-lanceolatis, acutis, carnosulis, 2,5—4 cm longis, 3,5—5 mm latis, vaginis ad 7 mm longis ad haerentibus; inflorescentiis erectis, ex axillis vaginalium singulis, pedunculo brevi, plurivaginulato, racemo ipso dense 10—20-floro, folia vulgo plus-minus-ve excedente, usque ad 4,5 cm longo, c. 3 cm diametente; bracteis patentibus, lanceolatis, valde acuminatis, ovario pedicellato 2—3-plo brevioribus; floribus illis *N. bicoloris* Ldl. similibus et fere aequimagnis, glabris, valde tenuibus; sepalis linear-lanceolatis, acuminatis, 3-nerviis 9,5 mm longis, lateralibus obliquis, intermedio paulo angustioribus; petalis e basi oblique linear-acuminatissimis, 3-nerviis, quam sepala subaequilongis; labelli ungue gracili, linear, 3,5 mm longo, lamina e basi angusta biauriculata subito anchoriformi-dilatata, antice elongato-acuminatissima, basi callo parvulo ornata, 6 mm longa, medio 2,75 mm lata, marginibus irregulari; columna tereti, glabra, c. 2,5 mm longa; ovario cum pedicello pergracili, glabro, c. 8 mm longo.

Costa Rica: Lisières des bois, Santiago de San Ramon, alt. 950 m — A. M. Brenes no. 91, VII. 1921.

Fleurs jolies, de couleur blanc-rosée. Très rare.

Eine nahe Verwandte der *N. bicolor* Ldl., von der sie durch die Form der Lippenplatte vorzüglich getrennt ist. Die am Grunde zweiöhrige, schmale, dann ankerförmige resp. tief herzförmig verbreiterte Lippenplatte mit der sehr lang ausgezogenen Spitze ist sehr bemerkenswert und ganz verschieden sowohl von *N. bicolor* Ldl. wie auch *N. Wullschlegeliana* Rehb. fil. und *N. coffeicola* Schltr., den einzigen Arten, die zum Vergleich in Betracht kommen.