

***Microstylis microtoides* Schltr. n. sp.**

Terrestris, erecta, 30—40 cm alta; caule vel bulbo ovoideo, c. 2 cm alto, unifoliato; folio basilari e basi vaginante lanceolato-elliptico, c. 18 cm longo, medio fere c. 2—3 cm lato; scapo nudo, flexuoso, racemo elongato inclusus usque ad 40 cm alto; racemo erecto, dense permultifloro, 15—20 cm longo, 4 mm diametro; bracteis minutis, deltoideis, acuminatis; floribus perparvulis, glabris, breviter pedicellatis; sepalo intermedio perlate ovato, obtuso, 1,75 mm longo, 2 mm lato, lateralibus late ellipticis, obtusis, intermedio aequilongis; petalis oblique lanceolatis, obtusis, dimidio superiore paulo angustatis, patentibus, 1 mm longis; labello late reniformi, integro, antice in lobulum parvulum oblongum obtusum producto, medio excavatione perlate remiformi intus longitudinaliter obscure tricostata ornato, 1 mm longo, medio fere 1,5 mm lato; columna perbrevi, crassa; ovario pedicellato, clavato, glabro, pedicello inclusus c. 1,7 mm longo.

**Costa Rica. — Tonduz.**

Mit *M. gracilis* Ridl. am nächsten verwandt, aber mit länger gestielten Blüten und einem viel breiteren Labellum. Die Blüten sind offenbar grünlich-gelb gewesen. Leider ist das Blatt an dem einzigen mir vorliegenden Exemplar unterhalb der Mitte abgerissen, so daß seine Beschreibung vielleicht noch abzuändern ist, wenn erst besseres Material vorliegt.

Die Blütentraube erinnert stark an die der australischen *Microtis*-Arten.