

373. **Microstylis Pittieri** Schltr., nov. spec.

Gracilis, erecta, parvula, c. 23 cm alta; radicibus filiformibus, glabris; caule basi bulboso-incrassato, unifoliato; folio in medium fere plantae sito late ovato-cordato, breviter acuminato, pedunculuni amplectente, 2,3 cm longo, 2,2 cm infra medium lato; pedunculo erecto, gracili, folium subduplo superante, racemo sublaxe multifloro, elongato, usque ad 7 cm longo; bracteis minutis, deltoideis, ovario multoties brevioribus; floribus in genere inter minores, glabris; sepalis oblongo-ligulatis, obtusiusculis, 2,25 mm longis, lateralibus obliquis, usque ad quartam partem apicalem connatis; petalis oblique linearibus, obtusiusculis, apicem versus sensim paulo angustatis; labello basi breviter auriculato, medio concava, e medio trilobato, lobis triangulis, obtusiusculis, intermedio duplo majore, auriculis basilaribus late triangulis subacutis, labello toto 2 mm longo, inter apices loborum lateralium 2,25 mm lato; columna brevi, crassa, c. 1 mm longa; ovario pedicellato glabro 4 mm longo.

Panama: Feuchte Wälder zwischen Alto de las Palmas und dem Gipfel des Cerro de Horqueta (Chiriqui), 2100—2268 m ü. d. M. — H. Pittier (B. S. P. C. Z. no. 3277 — blühend im März 1911.

Habituell gleicht die Pflanze auffallend der *M. ichtyorrhyncha* R. f., doch hat sie eine völlig verschiedene Lippe.