

31. *L. aciantha* (*Maxillaria aciantha* Rehb. fil.).
Pedunculus a bractea et vaginis ancipitibus obtuse acutis vernixiis stipatus. Perigonum prope corneum, aurantiacum, extus pallidius, viridi aspersum, intus glutinosum. Sepalum dorsale carinatum, carina apice retuso praerupta. Sepala lateralia acuta. Tepala angustiora, marginibus ante apicem revoluta. Labellum sigmoideum, ligulatum, medio utrinque obtusangulo dilatum, apice incrassatum, limbatum. Carina glutinosa a basi in discum usque ad genu flexurae ascendens. Foveola ante apicem marginatum glutinosa. Discus viridulus. Carina aurantiaca. Margo flavus atroviolaceo guttatus. Gynostemium clavatum. Androclinium subperpendiculare; ciliatulo limbosum. Rostellum utrinque decurrens, medio dente triangulo bidentato. Anthera mitrata vertice carinata velutina. Pollinia quaterna linearia liberrima in caudicula linearis cornea. Glandula obtuse rhombea, apice bidentata. — Mentum parvum. — Ob *Maxillaria Friedrichsthalii* nur Zwergform, oder eigene Art — darüber später. Von Hrn. v. Warscewicz eingeführt erhielten wir diese Art zuerst aus Hrn. Senator Jenisch's Garten, cultivirt von Hrn. Kramer, neuerlich aus Herrenhausen von Herrn Hofgärtner Wendland. So unähnlich sie der Lycaste ist, so muss sie doch zu dieser Gattung herüber nebst