

*M. chiriquiensis* Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, c. 15 cm alta; rhizomate erecto, distanter pseudo-bulbis obsesso, primum vaginis foliiferis oblecto, ut videtur compresso; radicibus tenuiter filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis valde compressis, oblongis, unifoliatis, 2—3 cm inter se distantibus, c. 2,5 cm longis, usque ad 1 cm latis; foliis erecto-patentibus, ligulatis, obtusis, pro genere tenuibus, usque ad 8 cm longis, ad 1 cm latis; inflorescentiis in axillis vaginarum rhizomatis vel caulis juvenilis natis, abbreviatis, unifloris, pedunculo perbrevis vaginis paucis oblecto; bractea acuta ovarium aequante; flore in genere inter minores, glabro; sepalis oblongis, acutis vel acuminatis, 1,3 cm longis, lateralibus obliquis cum pede columnae mentum obtusum perbreve formantibus; petalis oblique ligulato-oblongis, obtusis, c. 1,1 cm longis; labello anguste oblongo, obtuso, carnosulo, infra medium margine utrinque plica insiliente ornato, dimidio anteriore utrinque plicis 2 aucto, apice obtusissimo, infra apicem apiculato-incrassato, callo depresso, obtuso e basi usque ad medium fere donato, c. 1 cm longo, medio fere c. 4 mm lato; columna leviter curvata, apicem versus paulo dilatata, c. 8 mm longa; ovario cylindraceo, glabro, c. 1 cm longo.

Panama: Chiriqui, c. 4000 Fuß ü. M. — no. 125.

Die Struktur der Blüten verweist die Art in die Verwandtschaft von *M. variabilis* Batem., aber der vegetative Aufbau ist schon dadurch ganz abweichend, daß lange beblätterte Sprosse gebildet werden, die mit den stark zusammengepreßten Pseudobulben abwechseln. Die Blüten sind gelb, mit schwarzpurpurner, an der Spitze orangegelber Lippe.