

107. *M. Friedrichsthali*: rhizomate valido incurvo, dense vaginato, vaginis abbreviatis, microscopice arphyllaceis, pseudobulbis oblongis, approximatis, compressis, costato 7 — 8 carinatis, rugis inter costas transversis (an etiam in viva?) apice diphyllis, foliis ligulatis, cuneatis, apice bilobis, foliis suppositis fulcientibus multo brevioribus, pedunculis aggregatis, abbreviatis, rectis seu curvulis, nunquam flexuosis, dense distiche vaginatis, vaginis ancipitibus, acutis, fusco-maculatis, imbricantibus, perigonio e vagina summa producto, curvulo, mento parvo, perigonii phyllis oblongis acutis, subaequilibus, summo tamen apice carinato, galeato, apice retuso, complicato, labello angustissimo rhombeo, canaliculato, obtuso, carinula elongata a basi ad medium, gynostemio clavato, androclinio ciliato, marginato, profundissime angustissimeque exciso, hinc descendenti bilobo supra foveam stigmaticam. Blätter 3—4 $\frac{1}{3}$ '' lang, etwa $\frac{1}{2}$ '' breit. Blüten etwas kleiner, als bei *M. acuminata*. „Huele de noche vocatur ob gratum, quem noctu spirat odorem." Guatemala. Prov. Chontales, in monte Aragua. Friedrichsthali.