

M. gatunensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica erecta, c. 20 cm alta; rhizomate subnullo; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbo subnullo, unifoliato, utrinque foliis vulgo 2 protectis; foliis erectis vel erecto-patentibus, ligulatis, obtusis, crassius carnosocoriaceis, ad 17 cm longis, medio ad 1,8 cm latis; inflorescentiis in axillis foliorum singulis, erectis, unifloris; pedunculo paucivaginulato, 1,5—2 cm longo; bractea ovario bene brevior; flore erecto, illo *M. crassifoliae* Rehb. f. paulo majore, lacteo-flavido; sepalis lanceolatis, acutis, glabris, c. 2 cm longis, lateralibus obliquis, cum pede columnae mentem brevissimum vix prominens formantibus; petalis oblique lanceolatis, subacutis, glabris, 1,7 cm longis; labello circuitu oblongo, 4-ta parte apicali manifeste trilobo, superne et margine minute papilloso-puberulo, 1,4 cm longo, inter apices loborum lateralium 5 mm lato, callo depresso ligulato, obtuso e basi usque supra medium ornato, lobis lateralibus abbreviatis, rotundatis, intermedio antico, semioblungo, obtuso; columna subrecta, glabra, c. 1 cm longa; ovario cylindraceo, glabro, 2,5 cm longo.

Panama: Gatun-See-Gebiet bei Panama — no. 207.

Habituell ist die Pflanze nicht von kurzwüchsigen Exemplaren der *M. crassifolia* (Ldl.) Rehb. f. zu unterscheiden. Die Blüten sind aber größer und heller in der Farbe; die Petalen breiter und die deutlich dreilappige Lippe ist oberseits dicht und sehr kurz papillös behaart.