

258. **Maxillaria cobanensis** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, c. 10 cm alta; rhizomate abbreviato, dense pseudobulbis obsesso, vaginis imbricantibus obtecto; radicibus filiformibus, elongatis, glabris; pseudobulbis cylindraceis, paulo compressis, unifoliatis, 1,5—2 cm longis, supra basin 0,4—0,5 cm diametentibus, apicem versus paululo angustatis; folio erecto vel erecto-patente, elliptico-ligulato, obtuso, basi subpetiolato-cuneato, 3,5—6 cm longo, medio fere 0,8—1,4 cm lato; pedunculis brevibus, basalibus, singulis vel 2—3-nis, vaginis paucis obtectis, 0,6—0,8 cm longis, unifloris; bractea vaginis simili, ovario subaequilonga; floribus in genere inter minores, erectis, glabris; sepalis ligulatis, apiculatis, 1,4 cm longis, lateralibus obliquis, subfalcatis, cum pede columnae mentum obtusum, breve formantibus; petalis oblique subspathulato-ligulatis, obtusis, sepalis paululo brevioribus; labello e basi cuneata obovato, antice angustato, obscure trilobato, lobis lateralibus rotundatis, obtusissimis, intermedio producto, quadrato, leviter exciso, labello toto 1 cm longo, supra medium 5,5 mm lato, carina linearis apice tridentata, e basi usque in medium labelli decurrente; columna gracili, glabra, 0,7 cm longa, pede 2,5 mm longo; anthera rotundata, obtusa, gibbo ornata, polliniis oblique oblongoideis, stipite subquadrato, brevi, glandula rotundata transversa; ovario cylindraceo glabro, c. 0,7 cm longo.

Guatemala: Bei Coban, c. 1350 m ü. d. M. — H. v. Türckheim no. II, 1890, blühend im Juli 1907.

Die Art gehört in die Verwandtschaft der *M. acervata* Rchb. f., ist aber schon äusserlich durch die viel breiteren Blätter und den gedrungeneren Wuchs zu erkennen.