

M. oreocharis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta vel subpatula, c. 50 cm longa; rhizomate elongato vaginis amplexentibus obtecto, c. 6 mm diametente; radicibus tenuiter filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis usque ad 3 cm inter se distantibus, oblongis, compressis, unifoliatis, 3,5—4 cm longis, medio fere 1,5—1,8 em latis; folio linearis, acuto, usque ad 38 cm longo, medio 7—8 mm lato, tenuiter coriaceo; inflorescentiis juxta basin pseudobulborum singulis natis, unifloris, pedunculo brevi 1—1,5 cm longo, paucivaginato; bractea ovario multoties breviore; flore in genere inter minores, vix illo *M. variabilis* Batem. majore; sepalis oblongo-lanceolatis, acutis, c. 1,6 cm longis, glabris, lateralibus obliquis, cum pede columna mentum breve obtusum formantibus; petalis sepalis lateralibus bene similibus sed paulo brevioribus, glabris; labello circuitu oblongo, e quarta parte apicali manifeste trilobo, 1,4 cm longo, inter apices loborum lateralium c. 5 mm lato, superne minutissime papilloso-puberulo, callo depresso linearis, obtuso, e basi usque supra medium ornato, lobis lateralibus parvulis oblique et obtuse triangulis, intermedio late ovali, obtuso, multo majore, incrassato c. 4,25 mm lato; columna levissime curvata, apicem versus paululo dilatata, c. 7 mm longa, clinandrio margine breviter lacerato-ciliolato; ovario cylindraceo, gracili, glabro, c. 2 cm longo.

Panama: Chiriquí, 4000—5000 Fuß ü. M. — no. 256.

Eine der vielen *Maxillaria*-Arten des Gebietes mit verlängertem Rhizom. Ich würde sie in die Verwandtschaft der *M. variabilis* Batem. verweisen, doch scheint das dreilappige Labellum eher auf eine Verwandtschaft mit *M. tenuifolia* Ldl. hinzudeuten, von der sie aber in den Blüten recht erheblich abweicht. Die Färbung der letzteren schildert Mr. Powell wie folgt: „Sepals stained red; petals white; lip maroon-red with yellow point; column white, anthercap red.“