

*Odontoglossum (Euodontoglossum) Warszewiczi:* perigonii phyllo summo oblongo cuneato, obtusato, ph. lateralibus externis oblongis acutis, angustioribus, l. internis oblongis, acutis, cuneatis; labello a basi latissime cuneata dilatato, pandurato-quadrilobo, lobis lateralibus obtusatis, minoribus, vix productis, lobo anteriori late cuneato, alte bilobo, lobo utroque obtuse rhombeo, marginibus externis hinc sinuato, denticulo minutissimo interposito inter utrumque; callo erecto hippocrepico (maxillari) antrorum clauso papillis velutino cum denticulo corneo infexo in medio, basilari in ima labelli parte suberecta, gynostemio humillimo, fovea stigmatica magna, oblonga, denticulo in limbo inferiori, alis integris, angustissimis, foveam stigmatam marginantibus.

Eine der herrlichsten Entdeckungen unseres Reisenden. Die schneeweissen Blüthen tragen einen goldigen Kamm, der von dem schönsten Purpurroth gesäumt ist. Meine grösste Blüthe ist zweimal so gross als die des *Oncidium sessile* (im getrockneten Zustande): mithin nächst *O. grande* eine der grössten Blüthen neben *O. nebulosum*. Blätter länglich, spitz. Deckblätter spitz-dreieckig, häutig, einnervig, siebenmal kürzer als der Stiel des langen Fruchtknotens. Blüthenstiel wenigblüthig. *Cordillera de Chiriqui*. 8000' auf Leguminosen. October—Januar.