

108. **Mormodes lobulatum** Schltr., nov. spec.

Pseudobulbis fusiformibus infra medium c. 3 cm diametentibus; racemis pedunculatis laxe 15—25-floris; pedunculo tereti glabro, vaginis 5—7 cucullatis brevibus obsesso, racemo incluso c. 60 cm longo; floribus illis *M. pardini* Ldl. fere aequimagnis, erecto-patentibus; sepalis lanceo-lato-ligulatis acutis, glabris, nervo medio extus apicem versus incrassato, longitudine 3 cm subattentibus, lateralibus paulo obliquis; petalis oblique lanceolatis acuminatis, quam sepala paulo latioribus et paulo brevioribus, glabris; labello e basi breviter unguiculata late cuneato-subreniforme, antice truncato et medio in lobulum ovatum breviter acuminatum producto, glabro, medio unguiculam versus incrassato, c. 2 cm longo, lamina medio c. 1,7 cm lata, lobulo apicali 0,6 cm longo; columna generis, paulo torta, clinandrio ampio acuminato, glabra; anthera cucullata apice subcaudato-acuminata, glabra; polliniis ovalibus, stipite lato subquadrato-oblongo, glandula transversa rotundata; ovario pedicellato-clavato, glabro, c. 3,5 cm longo.

Costa Rica: Bei Caños Gordas. — H. Pittier no. 11147, blühend im Februar 1897.

Es liegen von dieser durch die Form des Labellums ausgezeichneten Art nur Pseudobulbenstücke mit den Infloreszenzen vor. Offenbar gehört sie in die Verwandtschaft von *M. pardinum* Ldl.