

M. Powellii Schltr., nov. spec.

Pseudobulbi et folia nondum nota; racemo erecto vel adscendente, c. 30 cm alto; pedunculo c. 10—12 cm longo, tereti, glabro, racemo ipso subaxe 5—7-floro, usque ad 18 cm longo; bracteis oblongis, obtusis, parvulis, ovario pedicellato 5—6-plo brevioribus; floribus in genere inter maximos, glabris, fide collectoris olivaceo-brunneis; sepalis petalisque lanceolato-ligulatis, acuminatis, c. 4,8 cm longis, sepalis lateralis petalisque obliquis, petalis quam sepala paululo latioribus; labello e basi breviter unguiculata rhombeo-ovato, breviter acuminato vel apiculato, 4,8 cm longo, infra medium usque ad 2,2 cm lato, marginibus lateralibus recurvo; columna more generis torta c. 2 cm longa, clinandrio dorso longius producto, acuminato; anthera dorso alte acuminata, antice truncata; ovario cum pedicello cylindraceo, glabro, c. 3,5 cm longo.

Panama: An den Hinterwässern des Gatun-Sees — no. 59.

„Sepals and petals olive-brown; lip nearly as long as the sepals and petals, of a darker brown, curled under on sides only.“

Die Art dürfte mit *M. Wendlandii* Rehb. f. am nächsten verwandt sein, unterscheidet sich aber durch die Färbung der Blüten und die Form des Labellums. Sie gehört auch in die Nähe des *M. colossus* Rehb. f., das aber ein viel länger zugespitztes, deutliches rhombisches Labellum und eine mehr gedrehte Säule besitzt.