

N. Boothii (Ldl.) Schltr., nov. comb.

Maxillaria Boothii Ldl., in Bot. Reg. (1838), Misc. p. 52.

Dinema paleaceum Ldl., in Bot. Reg. (1840), Misc. p. 51.

Epidendrum auritum Ldl., in Bot. Reg. (1843), Misc. p. 4.

Epidendrum paleaceum Rehb. f., Beitr. Orch. Centr. Amer. (1866),
p. 80.

var. **triandrum** Schltr., nov. var., differt a forma typica floribus brevioribus, albis, petalis latioribus, labello brevioris, columna crassioris et brevioris triandra.

Panama: Auf Hügeln östlich Panama-City, etwa in Meereshöhe —
no. 131.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß hier doch eine triandrische Form einer eigenen Art vorliegen könnte. Das würde sich aber erst entscheiden lassen, wenn die normale Form gefunden ist.

Betreffs der Gattung *Nidema* möchte ich noch erklären, daß ich ihren Autoren in ihrer Aufstellung recht geben muß. Die beiden Arten, *N. Ottonis* (Rehb. f.) Britt. et Millsp. und *N. Boothii* (Ldl.), weichen zu sehr von *Epidendrum* ab, um sie dabei zu belassen, falls wir nicht die meisten Gattungen der *Epidendreae* in einen großen Topf (*Epidendrum*) zusammenwerfen wollen.