

**Notylia Ldl.**

**Notylia Brenesii** Schitr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, 15—18 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis compressis, ancipitibus, ovalibus, unifoliatis, c. 1,5 cm longis, medio fere c. 1 cm latis; folio erecto-patente, oblongo-ligulato, obtusiusculo, carnosulo; basi breviter angustato, 11—14 cm longo, medio fere 2—3,5 cm lato; inflorescentia erecto-patente, folia aequante vel paulo superante, pedunculo brevi pluri-

vaginulato, racemo ipso densius multifloro, cylindraceo, usque ad 16 cm longo, c. 1,4 cm diametiente; bracteis decurvis, anguste lanceolatis, acuminatissimis, inferioribus ovarium aequantibus, superioribus sensim paulo brevioribus; floribus in genere inter minores, albidis, glabris; sepalis c. 5 mm longis, intermedio lanceolato, subacuto, 7-nervio, concavulo, laterali-bus omnino liberis, oblique ligulatis, subacutis, 5-nerviis; petalis oblique ligulatus, subacutis, 3-nerviis, quam sepala paululo brevioribus; labello ex ungue pro genere perbrevis superne incrassato in laminam ellipticam dimidio anteriore lineari-productam obtusam dilatato, 4 mm longo, in basi laminae cuneato-rotundato, columna teretiuscula, glabra, c. 2,25 mm longa; ovario graciliter pedicellato, glabro, c. 5 mm longo.

Costa Rica: Bois humides à San Pedro de San Ramon, alt. 925 m — A. M. Brenes no. 173, XI. 1921. Fleurs blanches, à petals avec une petite tache jaune-claire.

Ganz offenbar eine Verwandte der *N. trisejala* Ldl., von der sie durch die vorn linealisch ausgezogene, an der Spitze stumpfe Lippe gut unterschieden ist.

Das von Reichenbach fil. und anderen Autoren zur Haupteinteilung der Sektion *Eunotyliia* gewählte Merkmal eines vorhandenen oder nicht vorhandenen Lippenkiels ist nicht sehr glücklich gewählt, da es zwischen beiden Typen alle möglichen Übergänge gibt.