

294. Notylia Koehleri Schltr., nov. spec.

Epiphytica, humilis, erecta, c. 6 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis compressis, oblongis, unifoliatis, vaginis foliiferis 2—3 obtectis, 1—1,5 cm altis, supra basin c. 0,5 cm latis; foliis erectis vel erecto-patentibus, oblongo-ligulatis, inaequaliter et obtuse bilobulatis, glabris, textura coriaceis, 4—5 cm longis, medio fere 0,8—1,2 cm latis; racemo dense multifloro, cylindrico, pedunculo tereti, vaginis pluribus lanceolatis acuminatis obsesso, c. 3,5 cm longo, racemo ipso c. 5 cm longo, 2 cm diametiente; bracteis recurvis, lanceolatis, acuminatis, ovario recurvulo aequilongis vel paulo brevioribus; floribus in genere mediocribus, recurvulis, glabris; sepalo intermedio anguste oblongo, obtuso, 0,6 cm longo, lateralibus usque ad apicem in laminam oblongam apice leviter retusam connatis, intermedio aequilongis; petalis subfalcato-ligulatis, obtusiusculis, 0,5 cm longis; labello e ungue pro genere brevi in laminam lanceolatam obtusam basi truncatam dimidio superiore angustatam dilatato, basi carinato-callosa, petalis aequilongo; columna teretiuscula, glabra, 0,3 cm longa, rostello in gibbum incrassato; ovario cum pedicello gracili, c. 0,7 cm longo.

Peru: An Kaffeebäumen der Hazienda St. Tereza, Rio Blanco (Chanchamayo), c. 1400 m ü. d. M. — E. Köhler, im Jahre 1906.

Durch die bis zur Spitze verwachsenen seitlichen Sepalen wird die Art in die Nähe von *N. Huegelii* Fenzl. und *N. bisepala* S. Moore verwiesen. Sie hat aber eine Schwiele am Grunde der Lippe und stumpfe Sepalen.