

**Oliveriana Ortizii** A. Fdz. sp. nov. . . . . . Fig. 1.

Herba epiphytica 15 cm. alta. Folia disticha, subcoriacea, basi articulata vaginae imbricatae; lamina oblongo-elliptica, 5,5-10 cm. longa, 1,5-2 cm. lata, apice acuto; vagina paulatim versus basim dilatata, 3-4,5 cm. longa, marginibus sinuosis, translucidis. Inflorescentia solitaria, axillaris, racemosa, pauciflora (4 floribus in exsiccato), laxa, 10 cm. longa; bracteis tubularibus, ostiolo obliquo, apice obtuso, 3-5 mm. longis. Flores patentes, viridi-flavi (fide collectoris); ovario cum pedicello 1,5 cm. longo. Sepala lateralía oblongo elliptica, 11 mm. longa, 3 mm. lata in parte media, apice acuto vel subacuminato; sepalum dorsale paulo latius quam lateralía. Petala obovato-oblonga, 7 mm. longa, 2,5 mm. lata in parte media superiore, apice subacuto, marginibus diminute, ciliolatis. Labellum in ambitu lato-obovatum, 7 mm. longum, 5mm. latum, carnosum, pubescens; parte superiore trilobatum, lobulis lateralibus subrotundatis, centrali angustiore, acuto, dorsaliter carinato; parte inferiore unguicula ad columnam prorsus adnata; disco trisulcato, puberulo. Columna valde minuta; anthera deltoidea, 2 mm. lata, nigra, hirsuto-muricata.


Distribución.- Endémica para Colombia.

*Typus*: Boyacá, Villa de Leiva, "La Capilla", alt. 2700 m. mayo 18, 1868, P. Ortiz-V., 101 (*Holotypus*, COL).

*Oliveriana egregia* Reichb. f. *Linnaea* 41: 111. 1876.

*Xenia* Orchidaceae 3; 63, t. 230, I. 1-4. 1883. . . Figura 2.

Epífita. Hojas oblongo-lanceoladas hasta de 13 cm. de largo, 2-2,5 cm. de ancho, ápice agudo o levemente mucronado, papiraceas, glabras, parte inferior en forma de vaina equitante, hasta de 3 cm. de largo. Inflorescencia axilar, solitaria, 30 cm. de largo; vainas o brácteas estériles 3, de 8-10 mm. de largo, tubulares ostiolo oblicuo, ápice obtuso; brácteas fértiles más anchas y más cortas que las anteriores. Flores "verde amarillento, con tintes moraduzcos en el envés de los sépalos y pétalos, sobre todo en las bases". Sépalos oblongo-lanceolados, 21-23 mm. de largo, 7 mm. de ancho. Pétalos similares a los sépalos, un poco más angostos. Labelo obdeltoideo, 11-13 mm. de largo, 15-18 mm. de ancho, pubérulo; calle trisulcato. Columna muy pequeña, gruesa.



*Oliveriana Ortizii* A. Fdz. sp. nov.

Hábito x 3/4; a, flor x 2; b, labelo y columna vista lateral x 4; c, lámina del labelo vista de frente x 2; d, antera y polinios x 3; e, ápice foliar.