

Oncidium Titania Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, perpusillum, floriferum 2—3 cm altum, acaule; radicibus filiformibus, tenuissimis; foliis in quoque surculo 4—6, equitantibus, linearis-ligulatis, obtusiusculis, 0,6—2 cm longis, usque ad 2,5—4 mm latis, carnosulis; inflorescentiis in axillis foliorum singulis natis, gracilibus, unifloris, pedunculo folium aequante vel paulo superante, setiformi; bractea minuta, ovata, ovario pedicellato multo breviore; flore erecto, aureo, in genere minuto, illo *O. glossomystax* R. f. minore, glabro; sepalis obovatis, obtuse apiculatis, c. 2 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ovalibus, obtusiusculis, quam sepala aequimagnis, sublatioribus; labello breviter unguiculato, alte trilobo, c. 5,5 mm longo, in basi lobi intermedii vix 4 mm lato, inter apices lateralium c. 3 mm lato, basi carinis 2 apicem versus triangulo-dilatatis usque supra basin loborum lateralium ornato, cum callo cuneato antice fimbriato usque in basin lobi intermedii decurrente ornato, lobis lateralibus oblique cuneato-obovatis, margine exteriore grosse crenato-dentatis, intermedio ex isthmo brevi abrupte semiovali-dilatato, leviter 4-lobulato, lobulis lateralibus semiorbicularibus, crenatis, anticis semioblongis, subcrenatis; columna perbrevi, c. 1,25 mm longa; auriculis satis magnis, extus crenulatis; ovario cum pedicello 5—6 mm longo, glabro.

Costa Rica: Auf *Psidium guayava* bei Carillo — C. Wercklé no. 63, blühend im Juli 1921.

Anfangs glaubte ich hier *O. gnomus* Kränzl. vor mir zu haben, doch unterscheidet sich die Pflanze nach der Beschreibung sowohl in den Lippen-schwielen wie auch in der Form der Lippenlappen.

Herr Wercklé berichtet von dieser Art, daß sie schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres zur Blüte gelange, also ähnlich wie Arten der Gattung *Geissanthera*.