

Oncidium universitas-cuencae Kgr. & Vázquez **sp. nov.**

Planta epiphytica, pro genere parva ad mediocris; **rhizoma** breve; **pseudobulbi** anguste ovati, 4-5,5 cm longi et 1,8-2,2 cm lati, lateraliter compressi, rotundato-ancipites, apice 1-foliati; **folium** tenuiter coriaceum, lanceolatum ad oblongo-lanceolatum, apice acutum, basin versus plicatum, 10-15 cm longum et 1,8-2,5 cm latum, pseudobulbi latere utrinque foliis 2-3 infrabulbosis; **inflorescentia** racemosa, ex innovatione semievoluta oriens, 35-40 cm longa, pedunculus erectus, subrectus, 24-28 cm longus, rhachis 4-7-flora; **bractea floris** ca. 4 mm longa, arcuata, acuta; **ovarium** pedicellatum 16-20 mm longum; **flores** inodori; **sepalum dorsale** patens, anguste ellipticum, subconcauum, apice recurvatum et apiculo, 11 mm longum et 4-5 mm latum; **sepala lateralalia** patentia, ad apicem fere connata, synsepalum ellipticum, 11 mm longum et 6 mm latum; **petala** reclinata ad replicata, 10 mm longa et 5 mm lata, late unguiculata, lamina late ovata, apice apiculo; **labellum** 3-lobatum, lobi laterales patentes, ovati, margine late sursum curvati, isthmus brevis, lobus intermedius reniformis, subplanus, antice emarginatus, callus ex toris 2 longis, apicem versus ascendentes, inter se connatis, antice liberis et carina interjecta, parva constans, dimidium basale calli supra longe pilosum, totum labellum 17 mm longum, ad lobos laterales 10-13 mm latum, ad lobum intermedium 17-20 mm latum; **columna** brevis, valida, ca. 6 mm longa, alis angustis, obsoletis, margines tabulae infrastigmaticae aucti et incrassati, superne in apiculos producti, margo clinandrii auctus, anthera et rostellum vix producta.


Coloratio: sepala et petala brunnea, labellum dilute purpureum, atropurpureo-punctatum, columna purpurea.

TYPUS: ECUADOR: Provincia Cañar: El Tambo, 2800 m, in Kultur in Blüte in der Orchideensammlung der Universität von Cuenca, Ecuador, *W. Königer WK-117* (Holotypus: M; Isotypen: QCA, Herb. H. Königer).

Pflanze epiphytisch, für die Gattung klein bis mittelgroß; **Rhizom** kurz; **Pseudobulben** schmal-eiförmig, 4-5,5 cm lang und 1,8-2,2 cm breit, seitlich zusammengedrückt, gerundet-zweikantig, oben 1-blättrig; **Blatt** dünnledrig, lanzettlich bis länglich-lanzettlich, oben spitz, zur Basis hin gefaltet, 10-15 cm lang und 1,8-2,5 cm breit, Pseudobulben auf beiden Seiten mit 2-3 Bulbenbasisblättern; **Infloreszenz** traubig, aus dem halbentwickelten Neutrieb entstehend, 35-40 cm lang, der Blütenstandsstiel aufrecht, fast gerade, 24-28 cm lang, die Rhachis 4-7-blütig; **Blütenbraktee** ca. 4 mm lang, enganliegend, spitz; das gestielte **Ovarium** 16-20 cm lang; **Blüten** duftlos; **dorsales Sepalum** abstehend, schmal-elliptisch, leicht konkav, oben zurückgebogen und mit einem Spitzchen, 11 mm lang und 4-5 mm breit; **laterale Sepalen** abstehend, fast bis zur Spitze verwachsen, das Synsepalum elliptisch, 11 mm lang und 6 mm breit; **Petalen** zurückgeneigt bis zurückgeschlagen, 10 mm lang und 5 mm breit, breit genagelt, die Platte breit-eiförmig, oben mit einem Spitzchen; **Lippe** 3-gelappt, die Seitenlappen abstehend, eiförmig, am Rand breit aufwärtsgebogen, der Isthmus kurz, der Mittellappen nierenförmig, fast eben, vorne ausgerandet, der Kallus aus 2 langen, nach vorne zu ansteigenden, untereinander verwachsenen, vorne freien Wulsten und einem dazwischenliegenden, kleinen Kiel bestehend, die Basishälfte des Kallus oberseits lang behaart, die ganze Lippe 17 mm lang, an den Seitenlappen 10-13 mm breit, am Mittellappen 17-20 mm breit; **Säule** kurz, kräftig, ca. 6 mm lang, mit schmalen, unscheinbaren Flügeln, die Ränder der Tabula vergrößert und verdickt, oben zu Spitzen verlängert, der Rand des Klinandriums vergrößert, Anthere und Rostellum kaum verlängert.

Färbung: Sepalen und Petalen braun, Lippe hellpurpurn, dunkelpurpurn getüpfelt, Säule purpurn.

ETYMOLOGIE: auf Wunsch von Dr. Diego Vázquez M. benannt nach der Universität von Cuenca, Ecuador, in deren Orchideensammlung diese Art entdeckt wurde.



Oncidium universitas-cuencae

Zeichnung: D. Pongratz

Plant epiphytic, small to medium in size for the genus; **rhizome** short; **pseudobulbs** narrowly ovate, 4-5.5 cm long and 1.8-2.2 cm wide, compressed laterally, rounded-two-edged, 1-leaved apically; **leaf** thinly coriaceous, lanceolate to oblong-lanceolate, acute apically, plicate towards the base, 10-15 cm long and 1.8-2.5 cm wide, pseudobulbs on both sides with 2-3 sheaths; **inflorescence** racemose, arising from the half-developed new growth, 35-40 cm long, the peduncle erect, almost straight, 24-28 cm long, the rachis 4-7-flowering; **floral bract** ca. 4 mm long, close, acute; the pedicelled **ovary** 16-20 mm long; **flowers** scentless; **dorsal sepal** spreading, narrowly elliptical, subconcave, recurved apically and with an apiculum, 11 mm long and 4-5 mm wide; **lateral sepals** spreading, connate almost near to the apex, the synsepal elliptical, 11 mm long and 6 mm wide; **petals** reclinate to replicate, 10 mm long and 5 mm wide, broadly clawed, the blade broadly ovate, with an apiculum above; **lip** 3-lobed, the lateral lobes spreading, ovate, broadly curved upwards marginally, the isthmus short, the midlobe reniform, almost flat, emarginate in front, the callus consisting of 2 long toruses ascending towards the apex, connate between each other and free in front and with a small keel placed between, the basal half of the callus long pilose above, the whole lip 17 mm long, 10-13 mm wide at the lateral lobes, 17-20 mm wide at the midlobe; **column** short, stout, ca. 6 mm long, with narrow, inconspicuous wings, the margins of the tabula enlarged and thickened, produced into apiculus above, anther and rostellum scarcely produced.

Colouring: Sepals and petals brown, lip light-purple, spotted with dark-purple, column purple.

ETYMOLOGY: By request of Dr. Diego Vázquez M. named for the University of Cuenca, Ecuador, in whose orchid collection this species has been discovered.

