


Oncidium albicans Kgr. sp. nov.

Planta epiphytica, erecta, pro genere mediocris; **rhizoma** breve; **pseudobulbi** anguste ovati, lateraliter compressi, 4-5 cm longi et 1,6-1,8 cm lati, apice 2-foliati, **folium** anguste lanceolatum, apice acutum, basin versus conduplicatum, 10-15 cm longum et 1,2-2 cm latum, pseudobulbi basi latere utrinque foliis 2-3 infrabulbosis; **inflorescentia** 25-30 cm longa, racemosa, 7-10-flora, ex axilla folii infrabulbosi oriens, erecta, recta, pedunculus longior quam rhachis, bracteis 2-3 obsessus; **bractea floris** arcta, acuta, ca. 7 mm longa; **ovarium** pedicellatum subrectum, ca. 20 mm longum; **flores** successive aperientes, postea omnes simul aperti, inodori; **sepalum dorsale** inclinatum et incurvatum, anguste ovatum, concavum, apice acutum et subplicatum, 11 mm longum et 6 mm latum; **sepala lateralia** inclinata, ad apicem fere in synsepalum concavum connata, 11 mm longa, ad unum duo et in statu non explanato 7 mm lata; **petala** inclinata, ovata, subconcava, apice acuta, 9 mm longa et 6 mm lata; **labellum** 3-lobatum, lobi laterales horizontaliter patentes et leviter sursum curvati, oblongi, subplani, apice rotundati ad truncati, fissura tantum a lobo intermedio disjuncti, lobus intermedius reniformis, margine irregulariter undulatus ad minute plicatus, antice emarginatus et longitudinaliter plicatus, callus ex toro alto, supra obliquo et subplano, antice oblique truncato et 2-gibboso constans, totum labellum 12 mm longum, basi 12 mm latum, antice 22 mm latum; **columna** ca. 5 mm longa, recta, exalata, tabula infrastigmatica carinis marginalibus, rotundatis, incrassatis, anthera vix producta, rostellum vix productum.

Coloratio: sepala et petala viridialba, labellum albidum, callus luteus.

TYPUS: ECUADOR: ohne genauen Fundort, in Kultur bei Ecuagenera, Ecuador, in Kultur in Blüte in München bei W. König WK-129 (Holotypus: M; Isotypus: Herb. H. König).

Pflanze epiphytisch, aufrecht, für die Gattung mittelgroß; **Rhizom** kurz; **Pseudobulben** schmal-eirund, seitlich zusammengedrückt, 4-5 cm lang und 1,6-1,8 cm breit, oben 2-blättrig; **Blatt** schmal-lanzettlich, oben spitz, zur Basis hin zusammengefaltet, 10-15 cm lang und 1,2-2 cm breit, Pseudobulben an der Basis auf beiden Seiten mit 2-3 Bulbenbasisblättern; **Infloreszenz** 25-30 cm lang, traubig, 7-10-blütig, aus der Achsel eines Bulbenbasisblattes entstehend, aufrecht, gerade, der Blütenstandsstiel länger als die Rhachis, mit 2-3 Brakteen besetzt; **Blütenbraktee** enganliegend, spitz, ca. 7 mm lang; das gestielte **Ovarium** fast gerade, ca. 20 mm lang; **Blüten** sich nacheinander öffnend, später alle zusammen offen, duftlos; **dorsales Sepalum** einwärtsgeneigt und einwärtsgebogen, schmal-eirund, konkav, oben spitz und leicht gefaltet, 11 mm lang und 6 mm breit; **laterale Sepalen** einwärtsgeneigt, bis fast zur Spitze zu einem konkaven Synsepalum verwachsen, 11 mm lang, zusammen und nicht ausgebreitet 7 mm breit; **Petalen**



Oncidium albicans Kgr.

Zeichnung: D. Pongratz

einwärtsgeneigt, eirund, leicht konkav, oben spitz, 9 mm lang und 6 mm breit; **Lippe** 3-gelappt, die Seitenlappen waagrecht abstehend und leicht aufwärtsgebogen, länglich, fast eben, außen gerundet bis gestutzt, nur durch einen Spalt vom Mittellappen getrennt, Mittellappen nierenförmig, am Rand unregelmäßig gewellt bis gefältelt, vorne ausgerandet und der Länge nach gefaltet, der Kallus aus einem hohen, oberseits schrägen und fast ebenen, vorne schräg gestutzten und 2-höckerigen Wulst bestehend, die ganze Lippe 12 mm lang, an der Basis 12 mm breit, vorne 22 mm breit; **Säule** ca. 5 mm lang, gerade, ohne Flügel, Tabula mit randständigen, gerundeten, verdickten Kielen, Anthere und Rostellum kaum verlängert.

Färbung: Sepalen und Petalen grünlichweiß, Lippe weißlich, Kallus gelb.

ETYMOLOGIE: aus dem Lateinischen *albicans*, "weißlich", sich auf die Färbung der Blüten beziehend.

Plant epiphytic, erect, medium in size for the genus; **rhizome** short; **pseudobulbs** narrowly ovate, compressed laterally, 4-5 cm long and 1.6-1.8 cm wide, 2-leaved apically; **leaf** narrowly lanceolate, acute apically, conduplicate towards the base, 10-15 cm long and 1.2-2 cm wide, pseudobulbs at the base on both sides with 2-3 sheaths; **inflorescence** 25-30 cm long, racemose, 7-10-flowering, arising from the axil of a sheath, erect, straight, the peduncle longer than the rachis, occupied with 2-3 bracts; **floral bract** close, acute, ca. 7 mm long; the pedicelled **ovary** almost straight, ca. 20 mm long; **flowers** opening sequentially, later all open together, scentless; **dorsal sepal** inclining and incurved, narrowly ovate, concave, acute and slightly plicate apically, 11 mm long and 6 mm wide; **lateral sepals** inclining, connate almost to the apex into a concave synsepalum, 11 mm long and 7 mm wide together and not expanded; **petals** inclining, ovate, slightly concave, acute apically, 9 mm long and 6 mm wide; **lip** 3-lobed, the lateral lobes horizontally spreading and slightly curved upwards, oblong, almost flat, rounded to truncate apically, separated from the midlobe only by a fissure, midlobe reniform, irregularly undulate to finely plicate at the margin, emarginate and longitudinally plicate at the apex, the callus consisting of a high torus oblique and almost flat above, obliquely truncate and 2-gibbous in front, the whole lip 12 mm long, 12 mm wide at the base and 22 mm wide in front; **column** ca. 5 mm long, straight, wingless, tabula with marginal, rounded, thickened keels, anther and rostellum scarcely produced. Colouring: Sepals and petals greenish-white, lip whitish, the callus yellow.

ETYMOLOGY: From the Latin *albicans*, "whitish", referring to the colouring of the flowers.