

O. fulgens Schltr., nov. spec.

Epiphyticum erectum sub anthesi certe supra bipedale; rhizomate valde abbreviato; radicibus satis tenuibus filiformibus, flexuosis; pseudo-bulbis valde approximatis, ovalibus, unifoliatis, compressis, mox rugosis, latere utrinque vagina 1—2 foliifera protectis, 4 cm longis, medio fere 2—2,5 cm latis; inflorescentiis paniculatis, in axillis vaginalium singulis, erectis, certe supra bipedalibus, mihi nondum notis, multifloris; bracteis hyalinis, lanceolatis, acuminatis, ovario graciliter pedicellato multoties brevioribus; floribus in genere inter mediocres, glabris, fulgido-aureis, basin versus sparsim brunneo-maculatis; sepalis oblanceolato-spathulatis, obtusis, intermedio 1,1 cm longo, marginibus leviter undulato, lateralibus falcato-obliquis, marginibus leviter undulatis, c. 1,5 cm longis; petalis sepalis lateralibus valde similibus, tamen brevioribus, 1,1 cm longis; labello e basi transverse rhombica in isthmum satis longum bene angustato, deinde in laminam apicalem reniformem apice excisam marginibus leviter undulatam sursum dilatato, basi callo 4-dactylo minutissime papilloso ornato, labello toto 1,7 cm longo, supra basin 1 cm lato, in medio isthmi 5 mm lato, lamina apicali c. 7 mm longa, infra medium 1,35 cm lata; columna brevi, c. 5 mm alta, auriculis semiovatis, apice acuminatis, callis 2 infra stigma minutissime papillosis; ovario pedicellato, gracili, glabro, c. 1,8 cm longo.

Panama: Chiriquí, 4000—5000 Fuß ü. M. — no. 157, blühend im Februar.—März.

Nach der Abbildung zu urteilen dürfte unsere Art mit *O. angustisepalum* Kränzl. verwandt sein. Sie unterscheidet sich aber durch den anders gestalteten, papillösen Lippencallus, die zugespitzten Lippen-öhrchen und die papillösen Säulenschwielen.

Die Blüten sind leuchtend goldgelb mit wenigen braunen Flecken am Grunde der Perigonteile.