

9) M. Warscewiczii.

Adsunt ramuli duo flexuosi cum vestigiis caulis primarii, quorum alter quatuor, alter quinque bracteas naviculares acutas ovario pedicellato quater breviores gerit. Flores illis Odontoglossi Karwinskii Rehb. fil. subaequales. Sepala ac tepala cuneato ligulata obtuse acuta margine crispula obscura (cinnamoinea?). Labellum sepalis bene longius ovatum, oblongum flabellatumve, antice bilobum seu retusum cum apiculo, basin versus velutinum, duabus tertiiis inferioribus obscurum concolor, anticum pallidum (cinnamomeum albumque?). Gynostemium crassum ac brevissimum, siccum vix lineam excedens. Androchiniun postice angulatum, angulum versus utrinque angulo insilienti; apterotatum; limbi foveae utrinque Miltoniarum more evoluti; dens rostellaris linearis retusus; tabula infrastigmatica margine superiori emarginata; lobo utroque laterali nunc simpliciter integerrimo, nunc paucicrenato; utrinque paucisulcatum; labellum mediae tabulae (nec lateribus) adnatum! — Planta milii diu dubia, cum an ad Oncidia, an ad Miltonias melius ducenda, nescirem; nunc tandem cum proprio Marte, tum suadente ipso ill. Lindley huc ducta, cum utrique nostrum novum genus non statuisse. — Detecta a nob. de Warscewicz. (Hab. sp. sicc. comm. ab ill. Lindley sub N. 428.)

Obs. Eandem speciem, seu valde affinem, jam diu novimus ex herbario Pöppigiano; sed statu deplorabili. Adsunt icon, specimen, scheda. — Icon profert plantam bipedalem. Folia stipantia tria, cuneato oblongo acuta. Pseudobulbus oblongus, monophyllus, folio reliquis foliis aequali. Pedunculus paulo brevior, nudus, apice biflorus, supra florem superiorem decisus ebracteatus (Tetradynamarum more). Flos exakte idem, quem descipsimus, sed duplo major; sepala ac tepala pulchre undulata. Adscripta haec: „Bleibt weg. Blumen im Hebar zerstört gefunden.“ — „Sobralia biflora Ruiz. Pav.“ (omnia praeter „biflora“ radendo prope destructa. —) „Diar. bot. N. 1765. Genus pone Catleyam cf. Icon. bot. Reg. t. 953.“ Specimen videtur iconi inservisse. Pseudobulbus oblongo ligulatus levissime paucicarinatus, nitidissimus, cicatrice folii latissima. Vaginae foliorum stipantium tres. Pedunculi vaginae glumaceae erectae sex; portio florida brevis. Bracteae glumaceae tres illis plantae Warscewiczii bis terve longiores, scilicet duas pollicis tertias longae. Flos a vermis prope destructus sepalorum tepalorumque spolia gerit pallidiora angustiora. Labelli — quondam vermis deliciosi — residua labello plantae Warscewiczianae similia, nervorum rete idem. Folia cuneato oblonga acuta subpedalia, tres pollenes lata.

Scheda haec offert: „1765. Pone Catleyam. Scapus 2—3 flor. Perianth. ex cinnamoineo flavescent, foliol. undulatis. Labell. sordide purpur. subrotundum, obcordatum, margine anteriore albo limbatum, medio discum incrassatum vernicosum ferens, appendice *) propria supra basin adactum, mediante eodem cum gynostemio ad stigma usque connatum. Gynost. breve, 3 quertr. truncatum. Pollin. mass. 2, cereac. caudicula linearis glandulae stigmatis conicae compressae acutissimae affixa.“ Diar. Cuchero. Febr. 1830.