

Oncidium hernandezii Kgr. sp. nov.


Planta epiphytica, erecta; **rhizoma** breve; **pseudobulbi** anguste ovati, lateraliter compressi, ancipites, 3,5-4,5 cm longi et 1-1,4 cm lati, apice 1-foliati; **folium** lanceolatum, 12-14 cm longum et 2,2-2,8 cm latum, pseudobulbi basi latere utrinque foliis 2-3 infrabulbosis; **inflorescentia** racemosa, ex pseudobulbo maturo oriens, 25-40 cm longa, pedunculus multo longior quam rhachis, rhachis vulgo 5-flora; **bractea floris** 4-6 mm longa, apice acuta; **ovarium** pedicellatum ca. 25 mm longum; **flores** leviter fragrant; **sepalum dorsale** patens, lanceolatum, concavum, subincurvum, in statu non explanato 11 mm longum et 5 mm latum; **sepala lateralalia** omnino vel fere omnino in synsepalum connata, synsepalum pronum, cymbiforme, in statu non explanato 14 mm longum (apicibus inclusis) et 6 mm latum; **petala** reclinata, elliptica, subplana, apice acuta et subplicata, 11 mm longa et 7 mm lata; **labellum** 3-lobatum, lobi laterales horizontaliter patentes, varie ovati, abrupte in isthmum obcuneatum transeunti, lobus intermedius reniformis, subconcavus, basi cordatus, margine late undulatus, antice varie emarginatus et latere utrinque incisus, callus ex toro brevi, oblique ascendenti constans, torus carinis lateralibus antice acutis et carina mediana altiore, totum labellum ca. 20 mm longum, basi 11 mm, lobo intermedio 25 mm latum; **columna** recta, valida, patens, 7 mm longa, alae obsoletissimae ad nullae, margines laterales tabulae infrastigmaticae valde dilatati, apice liberi et rotundati, margo clinandrii auctus, margine erosis, anthera vix producta et rostellum vix productum.

Coloratio: sepalia et petala brunnea, labellum dilute purpureum, valde atropurpureo-punctatum, callus flavus, columna atropurpurea.

TYPUS: ECUADOR: Provincia Napo, Oyacachi, 3000 m, in Kultur in Blüte bei Sr. Victor Hernandez in Quito, Ecuador, in Kultur in Blüte in München bei W. Königer WK-119 (Holotypus: M; Isotypen: QCA, Herb. H. Königer)

Pflanze epiphytisch, aufrecht; **Rhizom** kurz; **Pseudobulben** schmal-eiförmig, seitlich zusammengedrückt, 2-kantig, 3,5-4,5 cm lang und 1-1,4 cm breit, oben 1-blättrig, **Blatt** lanzettlich, 12-14 cm lang und 2,2-2,8 cm breit, Pseudobulben an der Basis seitlich auf beiden Seiten mit 2-3 Bulbenbasisblättern; **Infloreszenz** traubig, aus der voll entwickelten Pseudobulbe entstehend, 25-40 cm lang, der Blütenstandsstiel viel länger als die Rhachis, die Rhachis gewöhnlich 5-blütig; **Blütenbraktee** 4-6 mm lang, oben spitz; das gestielte **Ovarium** ca. 25 mm lang; **Blüten** schwach duftend; **dorsales Sepalum** abstehend, lanzettlich, konkav, leicht einwärtsgebogen, nicht ausgebreitet 11 mm lang und 5 mm breit; **laterale Sepalen** ganz oder fast ganz zu einem Synsepalum verwachsen, das Synsepalum nach vorne geneigt, kahnförmig, nicht ausgebreitet einschließlich der Spitzen 14 mm lang und 6 mm breit; **Petalen** zurückgeneigt, elliptisch, fast eben, oben spitz und leicht gefaltet, 11 mm lang und 7 mm breit; **Lippe** 3-gelappt, die Seitenlappen waagrecht abstehend, variabel eiförmig, abrupt in den verkehrt-keilförmigen Isthmus übergehend, der Mittellappen nierenförmig, leicht konkav, an der Basis herzförmig, am Rand breit gewellt, vorne variabel ausgerandet und seitlich auf beiden Seiten eingeschnitten, der Kallus aus einem kurzen, schrägen ansteigenden Wulst bestehend, der Wulst mit 2 seitlichen, vorne spitzen Kielen und einem höheren Mittelkiel, die ganze Lippe ca. 20 mm lang, an der Basis 11 mm, am Mittellappen 25 mm breit; **Säule** gerade, kräftig, abstehend, 7 mm lang, die Flügel sehr unscheinbar bis fehlend, die seitlichen Ränder der Tabula stark verbreitert, oben frei und gerundet, der Rand des Kliandriums vergrößert, am Rand genagt, Anthere und Rostellum kaum verlängert. **Färbung:** Sepalen und Petalen braun, Lippe hellpurpurn, kräftig dunkelpurpurn getüpfelt, der Kallus gelb, Säule dunkelpurpurn.

ETYMOLOGIE: benannt zu Ehren von Sr. Victor H. Hernandez D. aus Quito, Ecuador, der diese Art entdeckte.



Oncidium hernandezii Kgr.

Zeichnung: D. Pongratz

Plant epiphytic, erect; **rhizome** short; **pseudobulbs** narrowly ovate, compressed laterally, 2-edged, 3.5-4.5 cm long and 1-1.4 cm wide, 1-leaved apically; **leaf** lanceolate, 12-14 cm long and 2.2-2.8 cm wide, pseudobulbs at the base on both sides with 2-3 sheaths; **inflorescence** racemose, arising from the mature pseudobulb, 25-40 cm long, the peduncle much longer than the rachis, the rachis usually 5-flowering; **floral bract** 4-6 mm long, acute apically; the pedicelled **ovary** ca. 25 mm long; **flowers** faintly fragrant; **dorsal sepal** spreading, lanceolate, concave, slightly incurved, 11 mm long not expanded and 5 mm wide; **lateral sepals** entirely or almost entirely connate into a synsepal, the synsepal leaning forward, cymbiform, 14 mm long not expanded (including the tips) and 6 mm wide; **petals** reclinate, elliptical, almost flat, acute and subpubescent apically, 11 mm long and 7 mm wide; **lip** 3-lobed, the lateral lobes horizontally spreading, variably ovate, abruptly passing over into the obcuneate isthmus, the midlobe reniform, slightly concave, cordate basally, broadly undulate marginally, variably emarginate in front and on both sides incised, the callus consisting of a short, obliquely ascending torus, the torus with 2 lateral keels acute in front and a higher midline keel, the whole lip ca. 20 mm long, 11 mm wide at the base and 25 mm wide across the midlobe; **column** straight, stout, spreading, 7 mm long, the wings very inconspicuous to lacking, the lateral margins of the tabula strongly dilated, free and rounded above, the margin of the clinandrium enlarged, erose marginally, anther and rostellum scarcely produced.

Colouring: Sepals and petals brown, lip light-purple, strongly dotted with dark-purple, the callus yellow, column dark-purple.

ETYMOLOGY: Named in honour of Sr. Victor H. Hernandez D. of Quito, Ecuador, who discovered this species.