

O. Isthmi Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, sub anthesi 70—80 cm altum; rhizomate abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; pseudobulbis usque ad 5 cm inter se distantibus, anguste ovatis, compressis, mox longitudinaliter sulcatis, bifoliatis, c. 10—11 cm longis, infra medium usque ad 3 cm latis, latere utrinque vagina foliifera protectis; foliis erecto-patentibus, lineariloricatis, acutis, basin versus sensim paulo angustatis, usque ad 60 cm longis, medio fere usque ad 2 cm latis; inflorescentia paniculata ex axillis vaginarum erecta, usque ad 75 cm alta, pedunculo paucivaginato, c. 30 cm longo, panicula angusta, satis dense multiflora; bracteis tenuibus, ovato-deltoides, quam ovarium multo brevioribus; floribus in genere mediocribus, flavis, brunneo-maculatis, glabris; sepalis oblongis, subacutis, margine leviter undulatis, 1,1 cm longis, intermedio subsessili, lateralibus obliquis subunguiculatis; petalis oblique oblongis, subacutis, margine leviter undulatis, sessilibus, quam sepala fere aequilongis; labello manifeste trilobo, lobis basilaribus suborbicularibus, intermedio ex isthmo bene angusto subito in laminam late reniformum altius excisam dilatato, callo basali trapezoideo-3-lobulato, dente brevi acuto in quoque sinu aucto, labello toto 1,9 cm longo, inter apices lorum basium 8 mm lato, isthmo versus apicem 3 mm lato, lamina apicali 1 cm longa, 2 cm lata; columna brevi, c. 4 mm longa, alis dolabriformibus, subdenticulatis, utrinque obtusis; ovario pedicellato, gracili, glabro, 1,8 cm longo.

Panama: Sambo River, Süd-Darien, 200 m ü. M. — H. Pittier no. 5569, blühend im Februar 1912.

Ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, hier auch diese Pflanze zu beschreiben, obgleich sie nicht zu den „*Orchidaceae Powellianae*“ gehört. Die Art wird vielleicht am besten in die Nähe von *O. oblongatum* Ldl. verwiesen.

Die Blüten sind gelb mit braunen Querbändern und Flecken auf der unteren Hälfte der Sepalen und Petalen und braunem Fleck am Grunde des Lippenisthmus.