




Fig. 24. A: a—f *Oncidium drepanopterum* Kränzl.*) a flos $\frac{2}{1}$, b et c gynostemium c. basi labelli, d et e anthera, f pollinium. — B: a *O. trinasutum* Kränzl. a flos. — C: a—d *O. helicanthum* Kränzl. a flos vi expansus. b gynostemium c. basi labelli a latere visum, c id. a fronte visum, d pollinium. — D: a—f *O. lintricus* Kränzl. a flos $\frac{2}{1}$, b gynostemium a fronte, c id. a latere visum, d id. cum crista labelli, e anthera, f pollinium.

O. lintricus Kränzl. n. sp. — Pseudobulbi, folia, inflorescentia integra mihi non visa, adest solummodo ramulus paniculae 8 cm longus, 7-florus, bracteae ovato-triangularae, acutae, paleaceae, 3,5 mm longae, pedicelli cum ovariis 1,2 ad 1,5 cm longi. Sepala lanceolata, dorsale cum petalis paulo latoribus ceterum aequalibus connivens, sepala lateralia divergentia, longiora, ceterum aequalia, dorsale cum petalis 8 ad 9 mm, lateralia 4,2 cm longa. Labellum obscure trilobum, lobi laterales breves trianguli, apice rotundati, in lobum intermedium vix sic dicendum angustati, intermedium vel rectius totum labellum concavum, antice lintriforme, addito apiculo brevi in apice ipso prorae lintris apposito, crista labelli heptadactyla, dactylis acutis, totum labellum 8 ad 9 mm longum, basi 4 ad 5 mm latum. Gynostemium breve, valde curvatum, antice in processum curvulum leviter bipartitum productum, (si mavis utroque latere gynostemii antice labellum versus

*) S. 485 u. 494 ist für *O. drepanopterum* u. *O. trinasutum* Figur 23 (statt 24) angegeben, dies rührt davon her, daß später eine Figur eingeschaltet worden ist.

elongato), anthera antice retusa, caudicula satis longa, alae juxta foveam stigmaticam nullae. Flores obscure vel sordide lutei mihi visi. — Fig. 24 D: a—f.

Subäquatoriale andine Provinz. Costa Rica (Endres Orch. n. 168!)

Nota. Dolendum est quod hujusce speciei fragmentum tantum valde mancum habemus.