

190. **O. Rechingerianum** Kränzl. n. sp. — Rhizoma crassiusculum, foliis vaginatis obositum, lignosum. Pseudobulbi satis distantes, foliis 2 infrabulbosis linearibus, acuminatis, ad 20 cm longis, 4 cm latis suffulti, elongato-oblongi, valde compressi ancipitesque, tricostati, costis valde approximatis, diphyllic, ad 9 cm longi, 1,8 ad 2 cm lati. Folia e basi compressa linear-lanceolata, acuminata, ad 22 cm longa, 1,2 cm lata, textura pergamenea. Inflorescentia tenuis, nutans, paniculata, a dimidio ramosa, ad 90 cm longa, rami 4 ad 6 cm inter se distantes, pauciflori, denique fractiflexi, bracteae minutae, triangulae, pedicelli cum ovariis 1,8 cm longi, tenues. Sepala libera, oblongo-lanceolata, acuta. Petala aequilonga, oblonga, acuta, omnia 8 mm longa, sepulum dorsale 3 mm, lateralia 2,5 mm lata, castanea, luteo- vel luteo-albo-apiculata et marginata. Labellum basi rectilineum, lobi laterales parvi, rotundati, isthmus lobi intermedii latiusculus, antice in lobum haud multo latiorem, bilobum dilatatus, crista labelli basi simplex, mox in cornua 2 triangula, divergentia aucta, denuo bicornuta, antice in lobulos 3 membranaceos exiens ibique excavata, tota superficie minute papillosa, totum labellum circ. 1 cm longum, basi 6 mm, antice 8 mm latum, luteum, in dimidio superiore macula magna, castanea ornatum. Gynostemium gracile, alae satis magnae, plus minus lobulatae vel crenulatae, superne acutae, tabula infrastigmatica elongata, haud prosiliens, rostellum et anthera modice producta. — Fl. Aprili, Maio. — Fig. 18 C: a—c.

Subäquatoriale andine Provinz. Costa Rica (Endres!).

Nota. Singulari structura cristae notabilis, differt toto habitu paulum ab *O. dichromatico* Reichb. f. cui floribus haud dissimile. Labellum antice vix vel paulo latius quam basi. — Amicissimo Dr. Rechinger-Vindobonensi, de nobis nostroque opere optime merito, grato animo dicatum.