

7. **L. Wawraëana** BARB. ROD. *l. cit. tab. 557.*

L. caule secundario brevi, cylindraceo, uni-articulato; folio triplo majore caule, lineari-lanceolato, basi attenuatissimo, apice tridentato, erecto; racemo paucifloro, valde minore folio, filiformi; floribus parvis; sepalis superiore erecto, oblongo, acuto, basi concavo et apice explanato, inferioribus usque ad medium connatis, conformibus, angustioribus, dorso carinatis, omnibus interne ad partem explanatam arguté-pubescentibus, petalis minoribus, carnis, rhomboideis, semi-unguiculatis, acutis, dorso apice carinatis; labello lanciformi, unguiculato, marginibus lateralibus erectis, ad apicem semi-incurvo et ibi tumorem semi-pubescentem margines ornantem. Gynostemio claviformi, curvo, apice uni-dentato.

HAB. dans les forêts vierges de Rodeio, Province de Rio de Janeiro. Fleurit presque toute l'année.

Les petites fleurs de cette espèce sont jaune d'or, ayant à la base des sépales, transversalement, des stries brun-pourpre; les pétales sont pourprés et le labelle ôchre-jaune avec le sommet et la base pourpre. Le gynostème est blanc avec le sommet et la base pourpre. Cette espèce a une variété dont, outre quelques petites différences des sépales, le gynostème est plus mince et moins claviforme, la fleur est plus petite et presque toute jaune, ayant seulement les sépales quelques mouchetures carminées à la base.