

6. L. granulosa BARB. ROD. *l. cit. tab. 690.*

L. caule secundario bi-articulato, duabus squamis vaginantibus tecto, cylindraceo, semi-clavato, folio minore; folio elliptico, basi attenuato, apice tridentato; scapo majore folio, erecto, flexuoso, plurifloro; floribus semper solitariis; sepalis superiore lanceolato, acuto, antice pubescenti, dorso carinato, inferioribus angustioribus, connatis usque ad apicem, illie bidentatis, acutis, in medio pubescentibus, dorso carinatis; petalis carnosis, spathulatis, semi-acutis; labello unguiculato, (unguis utrinque ad basin unidentato lanceolato-sinuato, apice recurvo, obtuso, dorso carinato, granuloso, fronte semi-granuloso, cum duabus lamellis granulosis in medio. Gynostemio claviformi, incurvo, cum clinandri marginibus anguloso-denticulatis; mento granulosus.

HAB. croissant sur les arbres des montagnes de Petropolis à Rio de Janeiro dans les endroits sombres.
Fleurit en Octobre et Novembre.

Cette espèce est très-prochaine des *L. chrysosepala* et *Gunnigiana*, mais d'un port beaucoup plus grand. La sépale supérieure est blanche avec le sommet jaune-verdâtre trilignée et finement mouchetée de carmin, les inférieures sont blanc-jaunâtres bilignées de chaque côté de carmin foncé; le labelle est blanc finement moucheté de lilas à la base, jaune au sommet. Le gynostème est blanc finement moucheté de lilas au dos, avec le menton lilas-foncé.