

**LEPANTHES MONTIS-ROTUNDI** Ortiz, sp. nov.

Inter species subgeneris *Brachycladii* distinguitur foliis oblongo-ellipticis apice acutis trinerviis vilosis, floribus sat grandibus, sepalo dorsali elliptico apice subacuto, sepalis lateralibus plus quam dimidio connatis apicibus divergentibus acutis, petalis linearibus basi ampla apice pilosis, labello trilobulato lobis lateralibus columnam amplectentibus et lobo apicali cordato margine piloso.

**TIPO:** COLOMBIA: Cundinamarca, Guayabetal, «Monterredondo», ca. 2200 m, marzo 1975. *P. Ortiz 705* (Holotipo: Herbario de la Universidad Javeriana, Bogotá [HJJ]). Otros ejemplares vistos: Cundinamarca, Facatativá, El Dintel, 2800-2900 m., mayo 25 1952, *M. Schneider 505* (COL) (determinada como *L. peperomioides*).

**Plantas** pequeñas, epífitas, repentis, péndulas, con raíces en la base, con rizoma hasta de 1 cm de largo entre los ramicaules. Ramicaules abreviados, envueltos en dos vainas leplantiformes largamente pilosas. Hojas descendentes, carnosas, elípticas con ápice agudo, de tamaño variable, de 7-20 mm de largo por 3-6 mm de ancho, con 3 venas, con superficie corrugada, vilosas. **Inflorescencia** erecta, uniflora. **Flores** relativamente grandes, de color amarillo con venas y manchas rojas, lóbulos laterales del labelo amarillos, lóbulo medio rojo oscuro; **sépalo dorsal** elíptico con ápice subagudo, trinerviado, de 7 mm de largo por 4 mm de ancho, **sépalos laterales** connatos hasta más arriba de la mitad con apices agudos divergentes, de 7 mm de largo por 4 mm de ancho en la base del sinsépalo; **pétalos** lineares, en la base ensanchados, en el apice pubescentes, de 1 mm de largo; **labelo** trilobulado con lóbulos basales auriculados envolviendo la columna y lóbulo apical cordado, con márgenes pubescentes, de 3 mm de largo. **Columna** delgada, terete, inclinada hacia abajo y un poco ensanchada en el ápice, de 1.7 mm de largo.

**ETIMOLOGÍA:** *montis-rotundi* en latín significa «de monte redondo», en alusión al nombre del sitio donde se encontró el ejemplar tipo: la vereda de Monterredondo, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca).

Esta especie, una de las del subgénero *Brachycladium*, del que tenemos actualmente la excelente monografía del Dr. Luer (Luer 1994), se distingue de las demás del subgénero por sus hojas elípticas agudas con superficie corrugada, vilosas, trinerviadas; las flores son relativamente grandes dentro del subgénero, con los sépalos laterales connatos hasta más arriba del medio y con ápices divergentes, los pétalos muy pequeños, lineares ensanchados en la base y con el ápice pubescente; el labelo es trilobulado, con el lóbulo apical cordado.

**ETYMOLOGY:** *montis-rotundi* means in Latin «of the round mount», in allusion to the Spanish name (Monterredondo) of the place where the type specimen was found, in the municipality of Guayabetal (Cundinamarca, Colombia).

This species, belonging to subgenus *Brachycladium*, of which we now have the excellent monograph by Dr. Luer (Luer 1994), is distinguished from the other species in the subgenus by its leaves being elliptic, acute, with a corrugated surface, hairy, 3-nerved; the flowers are relatively large for the subgenus, the lateral sepals connate for more than half their length and with divergent apices, the petals very small, linear, enlarged at the base and pubescent at the apex; the lip is 3-lobed, the apical lobe heart-shaped.