


Platystele dasyglossa P. Ortiz, sp. nov.

Plantae parvae, caespitosae, epiphytiae, caulis secundariis brevissimis vaginatis, unifoliatis, foliis parvis coriaceis ellipticis obtusiusculis, minute triapiculatis, basi cuneatis, petiolatis, racemo abbreviato umbellifloro paucifloro, quam folium breviore, floribus pusillis simultaneis, pedunculo tenui, sepalis rotundo-ellipticis, breviter apiculatis, concavis, minutissime ciliolatis, aureis petal's ellipticis breviter apiculatis, minutissime ciliolatis, aureis, label'o ovato-triangulari, quam sepala longiore, ecal'oso, piloso praesertim versus apicem, rubro excepto apice inflexo flagellante, columna brevi antice expansa.

Plantas pequeñas, cespitosas, epífitas. Tallos secundarios muy breves, de aprox. 3.5 mm. de longitud, cubiertos de pocas vainas, unifoliados. Hoja coriácea, elíptica, un poco obtusa, con ápice diminutamente triapiculado, con la base cuneada, con pecíolo acanalado, de aprox. 30 mm. de longitud, incluido el pecíolo, y 11 mm. de anchura máxima. Inflorescencia en racimo abbreviado, paucifloro, umbeliforme, más corta que la hoja, con flores diminutas, simultáneas, pedúnculo delgado, que nace de un nudo del tallo secundario, de 7 mm. de longitud, con 3 vainas delgadas, distantes; brácteas florales agudas, de hasta 1.3 mm. de longitud; ovario de aprox. 0.5 mm. de longitud. Sépalos redondo elípticos, brevemente apiculados, libres, cóncavos, muy diminuta y cortamente ciliolados, de color amarillo, de 1 mm. de longitud y 0.9 mm. de anchura en el centro; pétalos anchamente elípticos, amarillos, muy diminuta y cortamente ciliolados, de aprox. 0.8 mm. de longitud y 0.5 mm. de anchura; labelo ovado-triangular, piloso-peludo, con pelos más largos en el ápice, de color rojo, excepto en el ápice amarillo, con ápice alargado, inflexo, de 1.8 mm. de longitud y 0.9 de anchura en la base. Columna corta, ensanchada apicalmente, con estigma frontal; polinios 2.



***Platystele dasyglossa* P. Ortiz**

ETIMOLOGIA: Del griego **dasys**: “peludo” y **glossa**: “lengua” (labelo), debido a su característico labelo alargado, cubierto de pelos.

TIPO: **COLOMBIA:** CHOCO, Bahía Solano, Quebrada Resaquita, frente a Mecana, reco'. G. Misas, ene. 1976, R. Escobar 1857 (HOLOTIPO: COL).

DISTRIBUCION: Colombia, Costa del Pacífico.

Esta pequeña especie se asemeja a **Platystele umbellata** P. Ortiz por tener flores en racimo umbeliforme, característica poco común, pero se distingue claramente por su labelo mucho más largo que los sépalos, con ápice alargado, peludo, inflexo. Los cilios de los sépalos y pétalos apenas son perceptibles bajo gran aumento.